

Zur Spätbehandlung von Kieferbrüchen und ihren Erfolgen

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der zahnärztlichen Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 24. Mai 1937

von

Hans Warczak

Zahnarzt aus Duisburg (Rhld.)

BONN 1937

Buchdruckerei P. Kautz, Bonn

Gedruckt mit Genehmigung der Med. Fakultät der Universität Bonn.

Referent: Professor Dr. B a l t e r s

Korreferent: Professor Dr. Freiherr v. R e d w i t z



Meiner lieben Mutter
in Dankbarkeit
gewidmet

Zur Spätbehandlung von Kieferbrüchen und ihren Erfolgen.

Disposition:

1. Einleitung.
 2. Wie kommt es zur Spätbehandlung von Kieferbrüchen?
 3. In diesem Zusammenhang: die Bedeutung des Röntgenbildes.
 4. Welche Folgen zeigen nicht- bzw. schlecht behandelte Kieferfrakturen?
 5. Wann muß eine Therapie einsetzen?
 6. Spätbehandlung:
 - a) von U.-K.-Brüchen
 - b) „ O.-K.-Brüchen
 - c) „ Brüchen zahnloser Kiefer
 - d) „ Kinderkiefen
 - e) „ Pseudarthrosen.
 7. Wann ist der chirurg. Eingriff (Osteotomie) nötig?
 8. Erfolge.
 9. Schlußwort.
-

Folgende aus dem Fachschrifttum entnommene, sowie von Herrn Professor Dr. Balters überlassene Fälle gaben die Veranlassung, obenstehendes Thema abzuhandeln.

Fall 1. Port: Veraltete Kieferfraktur. (Mo. f. Zahnheilkunde 1901).

Patient kommt erst 1 Monat nach dem Unfall in Behandlung. Es bestanden zwei Brüche des U.-K. und zwar zwischen $\overline{5}$ und $\overline{4}$ sowie zwischen $\overline{3}$ und $\overline{2}$. Das linke Fragment war nach oben innen disloziert; das mittlere nach innen unten, wobei die Schneidezähne mit ihren Kronen nach vorne gekippt waren. Das rechte Fragment war nach innen gekippt.

Zu Beginn der Behandlung bestand zwischen den Fragmenten eine Art von Pseudarthrosenbildung.

Die Behandlung wurde zweizeitig durchgeführt: zunächst Abwärtsbewegung des linken Fragments durch eine Dentalchiene. Der Erfolg: nach 14 Tagen war das Fragment in das Niveau der anderen Fragmente gebracht.

Dann wurde eine Sauerfche Schiene angebracht, an der rechts eine schiefe Ebene befestigt wurde. Diese Schiene sollte einestils das nach vorne dislozierte Stück nach rückwärts drängen, andernteils durch die Wirkung der schiefen Ebene das rechte Bruchstück in seine normale Lage nach auswärts drehen. Der zweite Teil nahm 8 Wochen in Anspruch. Es trat völlige Heilung und exakte Artikulation ein.

Fall 2. Lubowski: Behandlung disloziert verheilte U.-K.-Frakturen. (D. Mo. für Zahnheilkunde 1916).

Nach $1\frac{1}{2}$ Monaten setzte die Spätbehandlung ein. Der U.-K. war zweimal gebrochen, die eine Bruchlinie befand sich auf der linken Kieferseite zwischen erstem und zweitem Prämolare, die zweite Bruchlinie verlief zwischen seitlichem und mittlerem Schneidezahn. Das rechte größere Fragment war um 1 cm nach lingual verlagert. Das hintere linke Fragment war nach labial schräg abgedrängt und nach distal gehoben, sodaß nur die lingualen Höcker der unteren Molaren beim Zahnschluß getroffen wurden. Das mittlere Fragment war nach labial gepreßt und stand etwa in starker Stauung 1 cm proximal über den oberen Frontbogen hervor. Der Mund ließ sich nicht schließen. Es trat nun die oben erwähnte Berührung der Antagonisten ein. Manuell waren die dislozierten Fragmente nur schwer beweglich.

Die Behandlung wurde zweizeitig mit dem geteilten Drahtverband sowie Gummizügen vorgenommen. Nach drei Wochen war die richtige Einstellung der Fragmente in die Artikulation, nach $2\frac{1}{2}$ Monaten feste Verheilung erreicht.

Fall 3. Lubowski: Behandlung disloziert verheilte U.-K.-Frakturen (D. Mon. f. Zahnheilkunde 1916).

Drei Monate nach der Verwundung wurde der Patient zur Behandlung des U.-K.-Bruches überwiesen. Der Bruch zwischen $\overline{2}$ und $\overline{1}$ war mit gering federnder Beweglichkeit verheilt. Das rechte Fragment ragte weit nach labial, etwa 1 cm über die obere Zahnreihe mit ihren Antagonisten vor. Das linke Fragment war nach lingual gedrängt; die Antagonisten des Oberkiefers bißen auf die labiale Kronenfläche der Molaren. Durch diese dauernde Schiefe-Ebene-Wirkung war das kleine Fragment gekippt. Die Behandlung glich dem Prinzip des von Fall 2. Durch die ständig wirkenden Gummizüge wurden die disloziert verheilten Fragmente in einem Monat in die richtige Stellung und in normale Artikulation gebracht. Nach weiteren $1\frac{1}{2}$ Monaten trat feste Verheilung ein.

Fall 4. Lubowski: Behandlung disloziert verheilte U.-K.-Frakturen. (D. Mo. für Zahnheilkunde, 1916.)

Dieser Fall kam erst 6 Monate nach Unfall in Behandlung. Der Unterkiefer war zweifach gebrochen. Die erste Bruchlinie verlief durch den rechten Kieferwinkel, war aber fest verheilt. Die zweite Bruchlinie befand sich zwischen $\overline{2}$ und $\overline{3}$. Der linke Bruch zeigte geringe Federung. Das kleine linke Fragment war lingual gestellt und nach vorn etwa $1\frac{1}{2}$ cm vorgeschoben, das größere rechte nach lingual gedrückt.

Die Behandlung glich im Wesentlichen der von Fall 2 und 3. Nach drei Monaten war die Einstellung in den Kieferbogen vollzogen, in 3 weiteren Monaten trat die völlige Verheilung ein.

Fall 5. Walkhoff: Beitrag zur Behandlung schlecht geheilter Kieferbrüche (M.M.W. 1916).

Einem Soldaten wurde durch ein Gewehrgeßoß die rechte Kieferseite vom seitlichen Schneidezahn bis zum ersten Molaren zerschmettert. Das Resultat der nicht richtigen Behandlung war nach einem Jahr, als W. ihn zur Behandlung überwiesen bekam: kein Zahn des Oberkiefers traf auf einen des Unterkiefers, sondern die ganze linke untere Zahnreihe stand beim Zusammenbiß weit innerhalb der oberen und behinderte dadurch die Zungentätigkeit beim Essen. Zermalmen der Speise war unmöglich. Die linke Unterkieferhälfte war so weit unter der Zunge nach rechts gefallen, daß nach dem Zusammenwachsen der beiden Kieferfragmente der rechte untere Schneidezahn sich nur 1 cm vom ersten Molaren befand. Die Zunge war außerdem in diesem kleinen Zwischenraum am Alveolarfortsatz festgewachsen. W. gelang es auf rein orthopädischem Wege ohne jede Operation durch Schienung des Ober- und Unterkiefers innerhalb von 7 Monaten eine richtige Artikulation herzustellen und zwar mit Hilfe von Gummizügen und schiefer Ebene.

Es folgen nun noch einige von Herrn Prof. Dr. Balters behandelte Fälle:

Fall 1. Als die Spätbehandlung des H. M. am 18. 1. 37 einsetzte, ergab sich folgendes klinisches Bild: Der Zahnreihenschluß war unvollständig und deutete auf einen Bruch zwischen $\overline{3|}$ und $\overline{4|}$. Die Fragmente waren beweglich. Aus dem Bruchspalt trat Eiter, auch wies der Unterkieferrand in der Kinngegend eine sezernierende Fistel auf. Röntgenaufnahmen ergaben, daß der kleine Backenzahn im Bruchspalt stand und die Heilung verhinderte. Da die Bruchlinie schräg verlief, war das größere linke Fragment nach rückwärts und das kleinere rechte Fragment nach außen verschoben, sodaß das Untergesicht eine deutliche Asymmetrie aufwies.

Die Behandlung bestand in der Entfernung des kleinen Backzahnes, blutiger Reposition und Fixation durch Schienung. Am 11. 3. 37 konnte der Patient als geheilt entlassen werden.

Fall 2. Am 29. 10. 35 wurde der Patient K. v. B. mit einem schon längere Zeit bestehenden, noch nicht verheilten Unterkieferbruch zwischen $\overline{3|}$ und $\overline{4|}$ zur Behandlung überwiesen. Die Röntgenaufnahme ergab, daß durch Einlagerung eines Prämolaren in den Bruchspalt eine Konsolidation des Bruches nicht erfolgen konnte. Zudem war die früher vorgenommene Kieferschienung unzureichend gewesen. Die Fragmente waren beweglich, schoben sich aneinander vorbei.

Die Behandlung bestand in der Säuberung der Mundhöhle, Richtigstellung der Bruchenden unter Leitungsanästhesie sowie in der Anbringung eines Ringschienenverbandes unter gleichzeitiger Dehnung der Fragmente. Der Prämolar wurde hierauf entfernt. Am 20. 1. 36 war der Kieferbruch verheilt.

Fall 3. Erst $3\frac{1}{2}$ Monate nach erlittenem Unfall setzte bei W. F. die Spätbehandlung des Oberkieferbruches ein und zwar war der linke Oberkiefer abgebrochen. Die Bruchlinie verlief zwischen den beiden mittleren

Schneidezähnen durch Nasen- und Augenhöhle sowie durch das Jochbein. Das Fragment war nach rückwärts und abwärts verlagert, sodaß ein Zahnschluß unmöglich war. Das Bruchstück war als Ganzes beweglich und wurde bei jeder Schließbewegung nach oben gedrückt. Das Auge hatte keine Stütze, weshalb Doppelsehen eintrat. Eine spezialistische Behandlung war bis zur Überweifung des Falles am 13. 2. 36 nicht vorgenommen worden.

Die Behandlung setzte am 18. 2. 36 ein. Mittels Gußschiene, extraoralen Bügeln, Gummizügen sowie Kopfkappe wurde das Fragment nach vorn und nach oben gebracht. Am 6. 3. 36 war dies erreicht. Es wurde dann noch die andere Oberkieferhälfte geschiert, sowie ein Ringschienenverband im Unterkiefer angebracht, und die beiden Kiefer fest miteinander verbunden. Die Verbindung wurde am 31. 3. 36 gelöst und der Patient am 14. 5. 36 aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Nachuntersuchung am 15. 7. 36 ergab die völlige Heilung des Bruches. Anschließend erfolgte die prothetische Versorgung des Patienten.

Fall 4. Drei Monate waren verstrichen, als der Patient L. L. einer Spätbehandlung seiner Unterkieferfraktur zugeführt wurde. Die am 1. 12. 1936 vorgenommene Untersuchung ergab einen Bruch in der Gegend des $\overline{13}$. Das rechte größere Fragment war nach innen, das kleinere linke Fragment nach außen verlagert. Eine vertikale Verschiebung der Bruchenden war ebenfalls vorhanden. Eine manuelle Reposition der Bruchstücke war unmöglich. Zudem bestand eine Osteomyelitis der Fragmentstümpfe; infolge Sequestration war es zum Verlust eines Kieferstückes von 1 cm Länge gekommen. Kinn- und Mundfistel vervollständigten das klinische Bild. An Zähnen waren vorhanden $\overline{14}$ mit einem Granulom sowie der $\overline{17}$. Auf der andern Seite stand der $\overline{5}$, $\overline{6}$ sowie der $\overline{7}$ mit einem Granulom. Im Oberkiefer waren nur die Frontzähne vorhanden.

Die Behandlung umfaßte folgende Phasen: Am 19. 2. 36 wurde eine Hebelzugmaschine eingesetzt, um die Fragmente aus der falschen Stellung herauszutrennen. Es folgte am 6. 3. Apparaturwechsel und zwar trat jetzt ein Schraubenverband zur Annäherung der Bruchenden in Tätigkeit. Am 23. 3. schloß sich die Bruchfixierung an und am 16. 5. wurde ein Sicherungsverband angelegt. Die Heilung des Bruches war am 15. 7. 36 erreicht, sodaß anschließend die prothetische Versorgung des Patienten erfolgen konnte.

Man dürfte wohl heute ungeteilter Meinung darüber sein, daß Chirurgie und Zahnheilkunde bei der Behandlung von Kieferfrakturen, der Durchführung von Kieferresektionen, den Verschlüssen von Gaumendefekten und der operativen Behandlung starker Kieferdeformitäten auf eine enge Zusammenarbeit angewiesen sind, wenn ein voller Erfolg erreicht werden soll. Schon W a r n e k o s wies in der Berl. Klin. W. 1900 auf die Zeit vor 1900 hin, in der nur allzu oft Mißerfolge, d. h. schlecht oder

disloziert verheilte Brüche deshalb auftraten, weil Chirurg und Zahnarzt die Therapie nicht gemeinsam und einheitlich durchführten. Es war leider vielfach bis weit in die Kriegszeit, daß chirurgischerseits die Vorbehandlung erfolgte und ihr sich die zahnärztlichen Maßnahmen angeschlossen und es hat vieler Mühen und Opfer berufener Zahnärzte bedurft, ihre Gleichzeitigkeit zu erreichen. Es sei nur auf die Pionierarbeit von Suersen, Sauer, Schröder, Partsch, Hauptmeyer u. a. hingewiesen.

Die vorliegende Arbeit soll sich mit dem Kapitel der Kieferbruchbehandlung und zwar mit ihrer Spätverförgung befassen und es soll gezeigt werden, welche Erfolge durch gleichzeitige, sinngemäße chirurgische und zahnärztliche Maßnahmen erzielt werden können.

Welche Ursachen und Umstände bedingen nun überhaupt eine Spätbehandlung?

1. Veraltete und unzulängliche Methoden, die höchstens als Notbehandlung angeprochen werden können. So schreibt Haber er: „Die Fehler, die in erster Linie gemacht werden, sind die, daß heute noch vielfach die Meinung vertreten ist, man könne durch äußere Verbände (Funda, Capistr. simplex, duplex ...) eine Reposition bzw. nach erfolgter Reposition Retention der Fragmente erzielen. Das ist aber gänzlich falsch. Alle äußeren Verbände können höchstens bei durch äußere Weichteilverletzungen komplizierten Frakturen als Wundverbände in Frage kommen. Bei subkutanen Brüchen haben sie gar keinen Wert, höchstens als erster Notverband.“

2. Alle Fälle, bei denen außer der Kieferfraktur noch andere schwere Verletzungen oder Krankheiten vorhanden sind, sodaß eine Therapie der Kieferfraktur nicht rechtzeitig eingeleitet werden kann, und bewußt oder notgedrungen einer Spätbehandlung vorbehalten bleibt. Diese Fälle spielen in Kriegszeiten eine große Rolle. Nach Beendigung des Weltkrieges hat es vieler Jahre bedurft, um die Kieferkrüppel durch eine Spätbehandlung in besonderen Kliniken wiederherzustellen.

Im Frieden stellen die Fälle, bei denen eine andere schwere Verletzung (Schädelfrakturen ...) oder Erkrankung (Pneumonie, Meningitis ...) eine rechtzeitige Behandlung einer Kieferfraktur behindern, das Hauptkontingent der Spätbehandlung dar. Hier wird angesichts einer Lebensbedrohung die endgültige Behandlung der Kieferfraktur bewußt aufgeschoben werden müssen.

3. Eine Verheilung der Frakturenden in falscher Stellung durch verspätetes Anlegen der Schienung. (Perthes, Borchers weisen auf derartige Fälle hin, bei denen die Dentalchiene vom Techniker so spät geliefert wurde, daß die falsch verheilten Bruchenden durch eine Osteotomie wieder getrennt werden mußten). Diese Fälle dürften heute selten vorkommen, da die Schienung sich so vereinfacht hat, daß sie stets sofort ausgeführt werden kann.

4. Die leider noch heute in Wort und Schrift vertretene Ansicht, mit der Schienung abzuwarten „bis Weichteilverletzungen geheilt, beste-

hende Schwellungen abgeklungen seien.“ Es läßt sich leicht denken, daß dann die Spätbehandlung schwierige Verhältnisse vorfindet (Reichenbach.)

5. Die Unterbrechung der begonnenen Behandlung durch Ausbleiben des Patienten oder dessen eigenmächtiges Entfernen der Schienen. Reichenbach weist auf derartige Fälle hin. Sie führen oft zur Pseudarthrosenbildung, die ganz besondere Schwierigkeiten in der Therapie bedeuten kann.

6. Vernachlässigte oder verkannte Kieferfrakturen, die wegen der gestörten Artikulation und Kaufunktion zur Spätbehandlung kommen und dann unter erschwerten Bedingungen und manchmal auch geringen Heilungsaussichten eine Spätbehandlung verlangen (Reichenbach).

7. Die fahrlässige Verschleppung einer Behandlung mit der Begründung „Kieferbrüche brauchten keine Behandlung, sie heilten von selbst“. Wassmund beschreibt einen solch traurigen Fall, bei dem die Frakturstelle mit Jod betupft wurde. Nach $\frac{3}{4}$ Jahren kam der Patient zu Wassmund. Kinn- und Schleimhautfisteln, Dislokation und Pseudarthrose waren das Ergebnis der Verschleppung. Der Patient konnte nur flüssige und breiige Kost genießen, war stark abgemagert und seit dem Unfall arbeitsunfähig.

8. Ungenügende Fixation der Fragmente, die sich dauernd gegeneinander verschieben und den Bruch nicht fest werden lassen. Auch diese Fälle gehören in das Gebiet der Spätbehandlung, da sie ja „noch einmal“ behandelt werden müssen (Mayerhofer, Schröder).

9. Falsche Diagnosestellung durch einseitige Untersuchungsmethoden, d. h. durch eine lediglich klinische oder lediglich röntgenologische Untersuchung (Hauptmeyer, Schröder).

Selbst mit der besten klinischen Untersuchungsmethode lassen sich nicht alle Kieferbrüche in ihrer Art und ihrem Verlauf diagnostizieren. Das Röntgenbild muß zur Unterstützung herangezogen werden. Nur mit seiner Hilfe können oft nicht erkannte Brüche festgestellt werden, wertvolle Ergänzungen über den Verlauf von Brüchen gewonnen, zweifelhafte Diagnosen gesichert, Simulationen nachgewiesen werden, wobei das Röntgenbild die Beweiskraft eines von subjektiver Beurteilung freien dokumentarischen Beleges hat.

Unersetzlich ist das Röntgenbild zur Aufhellung der äußerst komplizierten Verhältnisse bei jener Pseudarthrosenbildung, die trotz richtiger Schienung eintritt, weil der Bruch gleichzeitig kombiniert ist mit der Fraktur einer Zahnwurzel oder weil ein Granulom am Zahn vorhanden ist, das eine Konsolidierung ausschließt.

Trotz seiner außerordentlichen Bedeutung kann jedoch das Röntgenbild niemals als Ersatz der klinischen Untersuchung dienen, sondern nur neben dieser bestehen. Es sei nur auf die Fehler hingewiesen, die durch unscharfe Zeichnung, lineäre Aufhellung zustande kommen und jedem Röntgenbild Grenzen setzen. Hinzu kommen noch die Täuschungen, die sich bei den besonders schwierigen Schädelaufnahmen noch da-

durch einstellen können, daß verschiedene Knochenpartien überlagert erscheinen und Anlaß zu verhängnisvollen Irrtümern geben können.

Es soll an dieser Stelle noch hingewiesen werden auf die Bedeutung, die dem Röntgenbild bei der Behandlung von Kieferbrüchen zukommt. Und zwar sowohl bei dem Behandlungsplan sowie dem Behandlungsverlauf. Es gibt wertvolle Fingerzeige bezüglich der zu wählenden Schnitttrichtung, manchmal des ganzen Operationsplanes. Während des Heilungsverlaufes zeigt es uns die Wirkung der Schienung auf die Kieferstümpfe an, da die Einstellung in die richtige Artikulation nur allmählich vor sich geht. Ferner zeigt uns nur das Röntgenbild den Knochenbildungsprozeß auf, und zwar ob sich Kallus überhaupt bildet oder in welchem Bildungszustand der Kallus sich während der Schienung befindet. Bestehende oder während der Heilung auftretende Komplikationen werden frühzeitig durch das Röntgenbild nachgewiesen.

Nicht oder schlecht behandelte Kieferbrüche müssen natürlich auch Folgen zeitigen, die unser ärztliches Interesse erwecken und uns zwingen, uns dieser Kieferkrüppel anzunehmen.

Halten wir zunächst fest, daß die Auswirkungen selbst einer verhältnismäßig geringen Verschiebung der Bruchenden bei Kieferbrüchen weit größere sind, als bei den meisten anderen Knochenbrüchen. Denn wenn ein Fragment nur um ein Weniges gegen das andere verschoben ist, können die Zähne, die es trägt die andere Kieferhälfte nicht mehr berühren. Die Artikulation sowie die Okklusion der betreffenden Kieferhälfte ist gestört, sie wird vom Kauakte ausgeschlossen.

Am besten und eindringlichsten zeigen sich aber die Folgen an jenem von Reichenbach beschriebenen Fall, wobei es infolge der nicht spezialistischen Behandlung zu Dislokationen, Pseudarthrosenbildung gekommen war und Kinn- und Schleimhautfisteln das traurige Bild vervollständigten. Nicht genug damit, sind solche Patienten garnicht in der Lage, feste Speisen zu kauen, geschieht dies doch, so verspüren sie heftige Schmerzen. Sie sind somit auf flüssige und breiige Kost angewiesen, mageren daher ab und können sogar arbeitsunfähig sein (Wassmund, Schröder, Hauptmeyer).

Schwerwiegend sind Pseudarthrosen bei Kindern. Sie führen zu Störungen im Wachstum des erkrankten Knochens. Die kranke Seite bleibt im Wachstum erheblich zurück.

Kosmetische Unzulänglichkeiten treten natürlich auch im Gefolge dieser Art von nicht bzw. schlecht behandelten Kieferbrüchen auf. Angefangen von der Verschiebung der Mittellinie über offenen Biß oder Verschiebung des Kinns nach der kranken Seite bis zur Entstellung des Gesichtes (Asymmetrie). Diese Art von Folgen können eine bedeutende Rolle im sozialen Leben des Betroffenen spielen. Ihre Behebung ist dann keine kosmetische Angelegenheit mehr, sondern erfordert eine Korrektur als Pflichtleistung, was bei der Beurteilung von Versicherungsfällen äußerst wichtig ist.

Fuchs führt hierzu 2 Fälle an:

1. Der Schweißer A.E. wurde am 13. 6. 96 durch den Schlag einer Deichsel am U.-K. verletzt. Der bewußtlose Patient wurde nach Verforung der Weichteilverletzung ins Kruppsche Lazarett eingeliefert und stationär behandelt. Es wurde eine komplizierte Fraktur des linken horizontalen U.-K.-Astes festgestellt. Zahnärztliche Maßnahmen wurden nicht getroffen. Nach Abschluß der Behandlung blieb eine schwere Deformierung des U.-K. Die Folgen aber waren für den Patienten außerordentlich hindernde, das Gesicht war entstellt, die Sprache war undeutlich geworden, die Artikulation war vollständig zerstört. Feste Speisen konnten nicht mehr zerkleinert werden. Die trotzdem unzerkleinert geschluckte Nahrung verursachte dauernde Magenbeschwerden, die Speisen wurden im Magen und Darmkanal nicht genügend ausgenutzt. Der Patient war auf flüssige oder breiige Nahrung angewiesen. Eine solche Ernährungsweise war für die Dauer kostspielig und umständlich für den unbegüterten Arbeiter. Die Ernährung war daher infolge all dieser Schwierigkeiten ungenügend, das Körpergewicht ging zurück, und die weitere Folge war ein Sinken der körperlichen Leistungsfähigkeit. Als 7 Jahre nach dem Unfall der Patient im Jahre 1903 in die Behandlung von Witzel kam, konnte auch diese zahnärztliche Behandlung infolge der inzwischen stattgefundenen Vernarbungen und Deformierungen kein befriedigendes Ergebnis mehr bringen.

Fall 2. Die gleichen Folgen einer unzweckmäßig erfolgten Kieferbruchbehandlung sind bei dem heute noch lebenden 81jährigen Kruppschen Pensionär A.H. zu beobachten.

Im Jahre 1900 kam der damals 46jährige Kruppsche Arbeiter durch Ausgleiten auf einer Obstschale zu Fall. Er schlug mit dem Unterkiefer auf die Kante eines Spülbeckens auf. Die Untersuchung ergab eine Fraktur des linken horizontalen U.-K.-Astes. Der Bruch wurde von außen geöffnet und eine Knochennaht mit Silberdraht angelegt, die Weichteile wurden vernäht. Der Patient lag sehr lange im Krankenhaus. Die Wunde begann zu eitern. Zahlreiche Sequester und auch der Silberdraht stießen sich ab, ohne daß eine Konsolidierung eintrat. Eine zahnärztliche Behandlung erfolgte nicht und es traten die gleichen unerfreulichen Folgen und Begleiterscheinungen wie zu Fall 1. auf.

Das Gesicht ist asymmetrisch, der ganze U.-K. ist stark nach links verschoben, besonders beim Öffnen des Mundes. Die Fragmente sind gegeneinander verschieblich, es hat sich eine Pseudarthrose gebildet. Infolge der gestörten Artikulation sind 2] und 3] stark nach rechts gekippt.

Wann und in welchen Fällen ist ein therapeutisches Vorgehen unbedingt erforderlich?

Es ist klar, daß hier all die Fälle ausschalten, wo zwar eine difforme Verwachsung eingetreten ist, diese aber so gering ist, daß keine nennenswerte Störung auftritt und man durch geeignete Ausgleichung durch eine Prothese, durch Abschleifen oder Kronung Abhilfe schaffen kann. Es sei

in diesem Zusammenhang auf die winklig geheilten Frakturen hingewiesen. Bei ihnen dauert ein Abbau auf der konkaven Seite noch lange an und kann im Laufe der Jahre zur völligen Herstellung der alten Form des Knochens führen. Doch gehört eine so vollständige Regeneration nicht zur Regel und die Therapie darf sich keineswegs darauf verlassen, muß vielmehr versuchen, die bestehende Dislokation, wenn sie ausgeprägt ist, zu behandeln. In allen Fällen aber, in denen infolge mangelnder Artikulation und Okklusion sowie durch Pseudarthrosenbildung die Kaufunktion darnieder liegt, ein Kauen härterer Speisen nicht möglich ist, muß natürlich so schnell wie möglich vorgegangen werden. Man denke weiter an die schon erwähnten Folgen: Abmagerung des Patienten, Senkung seiner Leistungsfähigkeit, an kosmetische Momente, an Pseudarthrosenbildung bei Kindern mit den Wachstumsstörungen, so wird man klar all die Fälle übersehen, die einer Spät- bzw. Nachbehandlung bedürfen. Drei Faktoren sind es vor allem, der wir unsere größte Aufmerksamkeit schenken müssen: gute Öffnungsmöglichkeit, sichere Gelenkführung und gute Artikulation.

Es ist wichtig, die Korrektur der Stellung und die geeignete Fixation so schnell wie möglich vorzunehmen, da jede Woche, die ungenutzt verstreicht, größere Schwierigkeiten hinsichtlich der einzuschlagenden Therapie sowie eine Verminderung der Heilungsaussicht mit sich bringt. Ein schnelles Handeln in den besprochenen Fällen von Spätbehandlung ist also notwendig.

Zunächst soll einiges Grundsätzliches über die Spätbehandlung der Kieferbrüche gesagt werden, um dann auch auf die Spätbehandlung der U.-K. und O.-K.-Brüche im einzelnen eingehen zu können.

Bei der Spätbehandlung handelt es sich um Brüche, die mindestens einen Monat und älter sind. Es stehen sich bei der Spätbehandlung zwei grundverschiedene Ansichten gegenüber: die eine will, sobald eine manuelle Reposition nicht mehr möglich ist, nur chirurgisch vorgehen, um dann zu reponieren und die Retention anzuschließen, während die andere mit Hilfe von Apparaten eine erfolgreiche Therapie zu betreiben sucht. (Bimstein, Wustrow, Klughardt). Es ist aber m. E. falsch, sich nach einer Richtung hin zu binden, denn nur eine gegebenenfalls glücklich gegebene Synthese wird Erfolge zeitigen.

Es hat sich im Laufe der Zeit auf Grund der gemachten Erfahrungen gezeigt, daß man bei Brüchen, die nicht länger als $\frac{3}{4}$ Jahr bestehen, zunächst versuchen soll, mit Apparaten, welche sich der bekannten orthodontischen Kräfte: Gummizug, Schraube, Feder bedienen, vorzugehen.

Chirurgisches Vorgehen würde hier in manchen bestimmten Fällen, die später zu erörtern sind, vielleicht einen Fehler bedeuten.

Brüche aber, die über $\frac{3}{4}$ Jahr bestehen und in falscher Stellung verheilt sind, fallen in das Gebiet der Osteotomie. Hier mit orthodontischen Apparaten Therapie zu treiben, wäre vergebliche Mühe (Wustrow, Brochers-Perthes). Bei Pseudarthrosen liegen die Dinge anders. Hier muß zunächst das auslösende Moment, das allgemeiner (Lues, Tubc.) oder loka-

ler Natur (schlechte Fixation) gewesen sein kann, ausgeschaltet werden, um nun entweder mit physikalischen Mitteln oder rein chirurgisch oder durch Apparate eine Heilung zu erzielen. Eingehend soll hierüber unten gesprochen werden.

Man wird also von Fall zu Fall sich unter genauer Berücksichtigung der Verhältnisse zu überlegen haben, wie man vorzugehen hat. Es ist verständlich, daß man zunächst immer versuchen wird, ohne blutige Eingriffe, d. h. mit einfachen Apparaten zum Ziele zu kommen. Das ist nicht immer leicht, denn hat eine Fraktur längere Zeit in disloziertem Zustande verharret und haben sich die Muskeln verkürzt und Vernarbungsprozesse in verschobener Stellung eingesetzt, so bedarf es schon starker Kräfte und einer entsprechenden Apparatur.

Es soll zunächst nun versucht werden, einen Einblick zu geben in jene Richtung der Kieferbruchbehandlung, die es versucht, mit Apparaten, meist nach orthodontischen Prinzipien gebaut, die in Frage stehenden Fälle zu behandeln.

Die Prinzipien, nach denen solche Apparate konstruiert werden, richten sich nach den Erfahrungen, die aus der Orthodontie gemacht wurden. Es ist bekannt, daß sich das Knochengewebe leicht durch einen dauernden Zug oder Druck der Zähne beeinflussen läßt und dies um so leichter, je nachgiebiger, je jünger das Gewebe ist. Nun haben wir es bei der Kallusbildung des frakturierten Knochens mit einem jungen, sehr nachgiebigem Gewebe zu tun, wodurch wir imstande sind, durch geeignete Maßnahmen sogar eine weitgreifende Formveränderung dieser Teile zu erreichen. In welcher Weise wir die Kräfte: den Schraubenzug und -druck, die elastischen Gummibänder, den Federzug zur Anwendung bringen, hängt vom einzelnen Fall ab, d. h. nach welcher Richtung hin die Fragmente disloziert sind. Diese einzelnen Prinzipien können wir am besten wiederum an den Apparaten erkennen, die in der Literatur über die Fälle niedergelegt sind.

Da zur allmählichen Reposition der Gummizug eine außergewöhnliche Rolle spielt, sei an dieser Stelle einiges über seine Bedeutung gesagt:

Es ist Heilmüllers Verdienst, den Gummizug in die Therapie der Gesichtsbrüche eingeführt zu haben. Man darf ohne Übertreibung sagen, daß erst durch den Gummizug ideale Resultate erzielt werden und die Artikulation bei Kieferfrakturen wieder normal gestaltet werden kann. Der intermaxillär, von einem Führungsbogen des O.-K. nach dem U.-K. gespannte, stationär verankerte Gummizug ist in der Lage, innerhalb weniger Tage den U.-K. zu heben und je nach der Spannungsrichtung auch vertikale und mesiodistale Verschiebungen auszugleichen. Der Gummizug als eine kontinuierlich wirkende Kraft, welche sich in ihrer Richtung und Intensität leicht verändern läßt, übertrifft durch seine Vielseitigkeit und durch seine Einfachheit, ferner durch seine prompte Wirkung alle mechanischen Apparate. In reziproker Verankerung in Verbindung mit einer schiefen Ebene oder einer Gleitschiene leistet er beim Ausgleich vertikaler Dislokationen wertvolle Dienste besonders dann, wenn

gedrehte und gekippte Fragmente zu heben und in ihre normale Lage zurückzubringen sind. Als mechanische Kraft wird der Gummizug in reziproker Verankerung am Scherenbügel zusammen mit der Dehnungsschraube bei V-förmig verlagertem Bruchstück nach Verlust des Mittelstückes des U.-K. Stationär am U.-K. verankert; dient der Gummizug bei partiellen O.-K.-Frakturen zur Mesialbewegung distal verlagelter Partien. Die Druck- und Zugkraft der Schraube und des elastischen Bogens sind in den meisten Fällen durch den viel einfacher wirkenden Gummizug verdrängt worden. Zuweilen kommt es aber vor, daß auf die Schraube nicht ganz verzichtet werden kann. Ich denke an die Fälle, die ohne zahnärztliche Behandlung geblieben und ungünstig verwachsen sind. Für diese Fälle benötigen wir eine stärker wirkende Kraft als hier der Gummizug bieten kann. Mittels der Schraube sind wir in der Lage, selbst bei fest konsolidierten Brüchen noch gute Erfolge zu erzielen.

Ein anderes, äußerst wirklames Mittel, dessen wir uns bei der Behandlung bedienen, ist die Ausnutzung der Kaumuskeln zur Redressierung veralteter Brüche, z. B. mit Hilfe einer schiefen Ebene. Es dürfte ein ebenso einfaches und wirklames wie geniales Mittel darstellen.

Umreißen wir daher die Fälle, die mit Apparaten, die auf orthodontischer Grundlage aufgebaut sind, behandelt werden sollen.

Es müssen für die orthodontische Methode all die Fälle reserviert werden, bei denen eine allmähliche Bewegung der Fragmente unter Überwindung von Widerstand stattzufinden hat. Dieses trifft zu bei den älteren, bereits kallös verwachsenen Brüchen, bei disloziert verheilten Fragmenten, bei Splitterfrakturen mit bedeutend vertikalen Verlagerungen, ferner bei Brüchen im aufsteigenden Ast und am Gelenkfortsatz, besonders wenn sie doppelseitig auftreten. Ferner in Fällen mit pseudarthrotischer Verwachsung.

Es sollen nun zunächst die Methoden angeführt werden, durch die es möglich ist, die oben erwähnten Fälle zu heilen.

Beispiele aus der Praxis sollen dann das Angeführte rechtfertigen. Es hat sich auf Grund der Erfahrung gezeigt, daß der Drahtverband gegenüber dem Schienenverband der bessere ist und daher heute fast überall angewandt wird. Die Gründe hierfür liegen:

1. in der mangelnden Übersichtlichkeit durch den Schienenverband,
2. in seiner geringen Hygiene,
3. in der Tatsache, daß die Fixierung an Sicherheit zu wünschen übrig läßt,
4. die Notwendigkeit eines Abdruckes erfordert,
5. in der Abhängigkeit von einem Laboratorium.

Schröder sagt bereits in seinem Lehrbuch über „Frakturen und Luxationen der Kiefer“: es muß einmal mit Nachdruck gesagt werden, daß die Drahtverbände den Forderungen der modernen Chirurgie und der Hygiene des Mundes nicht mehr entsprechen, als alle den lingualen und buccalen Flächen der Zähne und dem Zahnfleisch in mehr oder minder breiter Fläche anliegenden Schienen, wie sie auch gestaltet sein mögen“.

Beginnen wir nun systematisch mit den verschiedenen Frakturen des U.-K. und ihrer Spätbehandlung.

Allgemein sei noch vorausgeschickt, daß U.-K.-Brüche besondere Schwierigkeiten bieten, da wir bei ihnen:

1. eine längere Heilungsdauer als bei anderen Knochen feststellen,
2. eine absolute Ruhigstellung nicht durchgeführt werden kann, da der U.-K. während der Behandlung funktionstüchtig sein soll und
3. der aufsteigende Ast nicht erfassbar ist.

I.

Spätbehandlung von Brüchen des Alveolarfortsatzes.

Alveolarbrüche:

Da die Alveolarbrüche des O.-K. nach denselben Grundätzen behandelt werden, sollen auch sie hier kurz erwähnt werden, um so zu verhindern, noch einmal auf sie einzugehen und Altes wiederholen zu müssen.

Die Reposition dieser Brüche muß in unseren Fällen durch die schwache, aber stetig wirkende Kraft eines Apparates vorgenommen werden. Dieser besteht in einem an den gefunden Zähnen zu befestigenden Drahtbogen, von dem aus elastische Kräfte auf die verlagerten Zähne wirken. Ob die Elastizität durch den Drahtbogen erzeugt wird, oder ob sie von besonderen Gummizügen geliefert wird, ist gleichgültig. Hier sei besonders der Anglebogen erwähnt, der durch Klammerbänder an den Molaren befestigt ist. Er läßt sich besonders gut für die Behandlung veralteter oder in schlechter Stellung verheilter Kieferbrüche anwenden, da er infolge der Art seiner Befestigung und infolge seiner großen Elastizität für die allmähliche Reponierung einzelner Zähne und kleiner Bruchstücke leichter in seiner Wirkung abzuschätzen ist als beispielsweise der kräftige Drahtbogen „Sauer's“. Mühelos kann man mit seiner Hilfe stark verlagerte Alv.-Teile mit ihren Zähnen, selbst wenn sie durch Kallusbildung bereits in abnormer Stellung fixiert sind, reponieren, indem man den Drahtbogen in einer der Dislokation entgegengesetzten Richtung wirken läßt. Ohne daß ein weiterer Apparat benötigt wird, kann man ihn nachher als Retentionsapparat verwenden.

Gelingt bei veralteten Brüchen im Frontzahngebiet, bei denen dazu das Fragment nach innen verlagert ist, die Reposition nicht sofort, so hat sich folgende einfache Methode bestens bewährt: Man legt einen halbrunden Draht entlang der Zahnreihe, befestigt ihn mit Bindendraht an die Zähne und zwar nach Augenmaß und holt durch Gummizüge das Fragment in einigen Tagen an die normale Stelle. Evtl. ist dann der Bogen noch einmal genau passend zu biegen.

Bruch der seitl. Alveolarfortsätze:

a) einseitig:

Handelt es sich um einen veralteten Bruch der seitlichen Alveolarfortsätze, so gelingt es hier fast immer mit Hilfe der Elastizität des

Drahtbogens, bald zu einem günstigen Resultat zu kommen. Man verwendet hierzu einen kräftigen runden Draht, der mehr Federkraft hat, als ein halbrunder und biegt ihn so, daß er im Gebiete des Fragmentes etwas von der Zahnreihe absteht. Er wird durch Drahtligaturen befestigt oder aber man verwendet Molarenbänder zur Fixation, was noch besser ist. Die Erfolge sind frappant. Schon innerhalb einer Woche ist meist die Korrektur gelungen (Wassmund).

b) doppelseitig:

Tritt der Alveolarbruch doppelseitig auf, was besonders beim O.-K. vorkommt, und sind die Fragmente nicht sofort zu reponieren, so kann man, solange die Fragmente noch nicht völlig konsolidiert sind, versuchen, sie durch Gummizüge an den freiliegenden Bogen heranzuholen. In den meisten Fällen ist dies möglich. Man kann natürlich auch in diesen Fällen die Elastizität des Bogens benutzen, aber der Erfolg ist nicht so sicher. Verlassen diese Methoden, so nimmt man die Zuflucht zur Transversalschraube. Wassmund geht so vor, daß er die Zähne überkappt und eine Transversalschraube anbringt. Ein besonderer dem vorderen Frontzahngebiet anliegender Bogen sorgt für die Beibehaltung der richtigen Stellung der Frontzähne. Die beiden Endzähne des Frontbezirks werden durch einen transversal verlaufenden Draht verbunden. Man kann auch den heute nicht mehr sehr häufig angewandten Dehnungsapparat nach Heydenhaus anwenden. Er ist genau so angeordnet, wie die Apparatur von Wassmund, nur ist ein Außenbogen mit den überkappten Zähnen verbunden, der die Front in richtiger Lage halten soll. Man könnte natürlich auch die in der Orthodontie bei Kompressionsanomalien verwandte Ainsworth-Apparatur verwenden. Sie besteht aus einer dem Gaumen anliegenden, in der Mitte durchfägten Kautschukplatte und Transversalschraube mit einem um die Frontzähne verlaufenden Drahtbogen.

Sind die Fragmente erst annähernd in richtiger Stellung, so erfolgt die feinere Einstellung in die Artikulation des U.-K. nach orthodontischen Gesichtspunkten mit Hilfe des Bogens. Eine Kautschukplatte verbleibt nach der Repositon einige Zeit zur Retention.

Dislokation nach außen:

Sind die Fragmente nach außen disloziert, so versucht man, sie durch transversale Gummizüge zu reponieren. Um nicht Gefahr zu laufen, durch den starken Zug die Zähne zu luxieren, an denen der Zug befestigt ist, geht man am besten so vor, daß die Zähne beiderseits an je einem Drahtbogen angebunden werden. Es wird nämlich damit erreicht, daß der Zug auf alle angebundenen Zähne gleichmäßig verteilt wird. Bei fest konsolidierten Fragmenten in falscher Stellung, die dem Gummizug nicht mehr nachgeben, kann Mobilisation durch Operation (submucöse Osteotomie) zweckmäßig sein. Meist aber läßt sich durch orthodontische Maßnahmen gute Artikulation herstellen.

Dislokation nach unten:

Eine andere Gruppe von veralteten Alveolarbrüchen stellen die mit Dislokation nach unten dar. Hier können folgende Methoden erfolgreich beschritten werden:

1. Borchers-Apparatur.

Sie besteht aus einem Außenbogen, der durch Bänder befestigt ist. Vestibulärwärts ist er im Bereich des Bruches abgeknickt. Das Fragment wird durch einen auch lingual herumgreifenden Bogen gefaßt. Gummizüge bringen das Fragment allmählich in die richtige Lage.

2. Misch-Bügel-Apparat folgte der gleichen Anordnung, nur ist die Abknickung „hüelförmig“ gestaltet mit zwei Schlaufen an den Enden, um Gummizüge aufzunehmen.

3. Schröders Apparatur setzt sich aus einem Außenbogen mit Bändern zusammen. Im Bereich des Bruches befindet sich ein zweiter. Die Zähne des Bruchstückes werden einzeln durch Bänder gefaßt und durch Gummizüge herangebracht. Der Zug nach oben hat die Nebenwirkung, daß er die Fragmente nach außen kippt. Das kann man zunächst vernachlässigen. Ist das Fragment in richtiger Höhe, was in einigen Tagen gelingt, wird ein durchgehender halbrunder Bogen eingelegt. Er muß so knapp und straff liegen, daß er das Fragment am Zahnhals in die richtige Lage zurückdrängt; die nach außen noch gekippte Zahnkrone wird durch einen zirkulären Gummizug retrudiert. Die Haken dazu werden mit Tinol angelötet bzw. finden sich am Röhrchen des Molarenbandes fertig. Die Retrusion kann auch von einem palatinal liegenden Bogen erfolgen.

4. Eine andere, sehr brauchbare Methode ist die von Reichenbach und zwar mit Hilfe des nach oben (im Oberkiefer) bzw. nach unten (im Unterkiefer) federnden Drahtbogens, den man zweckmäßig in Einschnittbändern ruhen läßt. Der Bügel hat das Bestreben, in seine Ruhelage zurückzukehren und nimmt das Bruchstück mit.

Mit Hilfe der angeführten Methoden wird man wohl stets bei der Spätbehandlung der Alveolarbrüche zum Ziele kommen.

Während die Therapie von Brüchen des Alveolarfortsatzes im O.-K. und U.-K. Übereinstimmung aufweist, und auch keine wesentlichen Unterschiede bei der Behandlung der einzelnen Fälle eintreten, weist im übrigen die Kieferbruchschienung des U.-K. prinzipielle Abweichungen von der des O.-K. auf. Die Differenzen ergeben sich aus der gelenkigen Verbindung des U.K. mit dem Schädel, während der O.-K. fest mit ihm verwachsen ist.

Genauere Reposition und sichere Retention der Fragmente sind für eine gute Heilung Vorbedingung. Wichtig ist ferner die Hygiene des Verbandes. Die Schienungen müssen die Bewegung des U.-K. im Rahmen der physiologischen Grenzen ermöglichen. Sie müssen funktionelle Verbände sein. Alle Methoden, die eine völlige Ruhigstellung des Kiefers mit sich bringen, dürfen nur vorübergehend angewandt werden.

Für die Schienung alter Kieferbrüche muß das gleiche Prinzip in Anwendung kommen, das die Chirurgie bei Brüchen von Extremitätenknochen in Anwendung bringt: der Extensionsverband. Sauer hat den Weg gewiesen. Die mit Kappen die Zähne angreifende Hebelzugmaschine Schellhorns, Meders verfolgen diesen Weg; ebenfalls gehören die Scherenapparate (nach Bruhn, Steinkamm, Hauptmeyer) hierher.

Die hier in Frage kommenden Brüche sind narbig und kallös meist so vereinigt, daß sie besondere Maßnahmen erfordern. Solange zwar der O.-K. intakt und genügend bezahnt ist, um starke Züge auszuhalten, wird man mit Gummizügen nach dem O.-K. immer am schnellsten zum Ziele gelangen. Um nicht einzelne Zähne zu lockern, ist die obere Zahnreihe und die Zahnreihe des Fragments durch einen leichten Drahtbogen zu fassen, der den an einem Zahn angreifenden Gummizug auf alle Zähne verteilt (Entlastungsbogen). Erlauben aber die oberen Zähne eine starke Zugwirkung nicht, so sind wir gezwungen, uns mit anderen Maßnahmen auf dem U.-K. zu beschränken (Scherenapparate, Nagelexension, extra-intraorale Apparate). Glücklicherweise sind diese Fälle selten.

Es soll hier auf die Methode von Sauer näher eingegangen werden, da man mit ihrer Hilfe in der Mehrzahl der Fälle fast immer gültig für Brüche bis zum Kieferwinkel zurecht kommt.

Sauer benutzte bei veralteten, in schlechter oder mit Substanzverlust verheilten Frakturen die schiefe Ebene in Verbindung mit seinem geteilten Drahtverband — letzterer wurde von Lubowski während des Krieges wieder aufgegriffen und verbessert. Seine Erfolge damit sind ausgezeichnet. Der Drahtverband soll einen allmählichen Ausgleich der Dislokation ermöglichen. Sauer stellte den Verband aus zwei, den Fragmenten entsprechenden Teilstücken her, die einzelnen an diesen durch feine Drahtligaturen ihre Befestigung finden, auf der lingualen Seite aber verschiebbar und einander verbunden sind und zwar so, daß das linguale Drahtende des einen Verbandstückes eine Strecke weit über das der anderen Seite in einer auf diesem angelöteten Kanüle verläuft. Die Anordnung gibt uns die Möglichkeit, den Verband ohne Schwierigkeit an den dislozierten Fragmenten zu befestigen. Da der die beiden Verbandsteile verbindende Draht stark federt, und immer wieder in die normale ihm anfangs gegebene Richtung und Form zurückstrebt, so wirkt der Verband sowohl in vertikaler sowie in horizontaler Richtung ausgleichend. Die schiefe Ebene, mit dem die Teilstücke des Verbandes beweglich vereinigenden Mittelstück, übt somit eine stetige sicher zum Ziel führende, regulierende Wirkung auf die Bruchstücke aus.

Die schiefe Ebene Sauer's bleibt uns ein außerordentlich wirksames, nicht zu ersetzendes Hilfsmittel aller jener Frakturen, bei denen eine Dislokation ad latus des einen oder anderen Fragmentes eingetreten ist, die nicht zugleich beim Anlegen des Verbandes aufgehoben werden kann. In erster Linie kommt sie bei Frakturen in Betracht, deren Bruchstücke durch eingetretene Kallusbildung in abnormer Stellung fixiert sind. Selbst der definitive Kallus gibt der bei jedem Schließen des Mundes durch die

schiefe Ebene in einer der Dislokation entgegengesetzten Richtung zur Wirkung kommenden Kraft der Kaumuskeln nach und es ist erstaunlich zu sehen, wie schnell bereits in abnormer Stellung verwachsene Fragmente mit Hilfe der schiefen Ebene mobilisiert werden. Aber nicht nur der Kallus, sondern auch narbiges B.G. gibt der stetigen Wirkung der schiefen Ebene nach. So lassen sich selbst längere Zeit bestehende Pseudarthrosen, die nach größeren Substanzverlusten meist infolge von Schußverletzungen am Kiefer zustande kommen, mit ihrer Hilfe soweit dehnen, daß die stark verlagerten Bruchstücke ihre normale Stellung wieder einnehmen (Schröder, Wassmund).

Brüche mit vertikaler Dislokation:

Handelt es sich nun um einfache, veraltete Frakturen innerhalb der Zahnreihe, bei denen in der Hauptsache eine vertikale Dislokation erfolgt ist, so gibt es hier eine Reihe von Methoden der Therapie, die sich in der Praxis bewährt haben. Sie sollen hier angeführt werden:

1. Schellhorn ging so vor, daß er die Zähne der beiden Fragmente überkappt, dann wurden an der äußeren Seite der Kappen kräftige, stark federnde Drahtbügel — er verwandte 16karätiges Platin — Gold angelötet und zwar so, daß der Drahtbügel des höher stehenden Fragments auf dem des anderen liegt. In einiger Entfernung von der Frakturteile wird sodann jederseits ein nach hinten offenes Häkchen auf den Drahtbügel festgelötet, die dazu bestimmt sind, Gummizüge anzubringen. Es gelingt so eine Abweichung nach der Seite sowie in vertikaler Richtung aufzuheben. Da die Apparatur infolge der Verwendung von Edelmetallen in der Herstellung zu teuer und immer an ein Laboratorium gebunden ist, hat sie sich trotz der damit erzielten guten Erfolge nicht durchgesetzt.
2. Wassmund geht in diesen Fällen so vor, daß er zwei Bögen in Röhrenbändern befestigt. Der Bogen des höheren Fragments liegt außerdem noch auf dem Falz eines Vollbandes auf, um nicht nach unten abweichen zu können. Senkrecht gespannte Züge heben das gesunkene Fragment. Nach Reposition werden die Bögen mit Bindendraht aneinander gebunden und die Retention gewährleistet.
3. Meder beschritt mit seinem Extensionsapparat folgenden Weg: er überkappt sämtliche Zähne und befestigt auf dieser gespannten Kappenschiene einen Bogen, der somit den Kauflächen der Zähne aufliegt. Die Kappen des Fragments tragen labial Halteknöpfe. Mit Hilfe von Drahtligaturen bringt er dann das verlagerte Fragment an die richtige Stelle.

Wassmund hat im Bestreben, die Kieferschienung möglichst einfach und unabhängig vom Laboratorium zu gestalten, folgende Vereinfachung der Meder'schen Apparatur durchgeführt: auf den Molaren jeder Seite liegt eine Kanüle, die durch kräftige Drahtschlingen an Schröderbänder angelötet ist. Sind die Molaren länger als die Kanülen, wird die Kanüle durch ein Stück Draht nach hinten verlängert. Das abgesunkene Fragment wird durch einen Entlastungsbogen gefaßt, der auch lingual herumgreift.

Die Zähne des kleineren Fragments tragen gleichfalls einen lingual herumgreifenden Bogen, von dem aus der auf den Kauflächen liegende Bügel mit Drahtligaturen noch besser gehalten wird, als die Kanüle es schon tut. Von dem hochliegenden Bogen werden zu dem abgefunkenen Fragment Gummizüge gespannt, die das Fragment heben.

4. Auch Schröders Extensionsverband leistet hier ebenfalls gute Dienste. Er ist denkbar einfach. Am abgefunkenen Fragment wird ein starker federnder Bogen fixiert. Er verläuft weiter in Höhe der abgefunkenen Zahnreihe und steht also im Bereich des anderen Fragments, unterhalb der Zahnreihe desselben. Durch Draht- und Seidenligaturen, die über die Kauflächen der Zähne verlaufen, wird der freiliegende Teil des Bogens angehoben. Damit wird langsam auch das abgefunkene Fragment gehoben. Die Ligaturen sind dauernd zu kürzen.

Dislokation nach der Mitte:

Was aber hat in den Fällen der Spätbehandlung zu geschehen, bei denen es zu einer Dislokation nach der Mitte gekommen ist? Bei einseitiger Adduktion sind hier gut anwendbar:

1. Die Schellhorn-Hebelzugmaschine,
2. der Schröder-Extensionsverband, zumal die Adduktion eines Fragments meist mit Absinken des anderen kombiniert ist. Bei reiner Adduktion wird der Schröder-Extensionsverband mit normal gespannten Ligaturen verwandt und das Fragment durch die Federung des Bogens an diesen herangeholt.
3. Evtl. ist auch die schiefe Ebene, gleichgültig ob diese nach Sauer, Wassmund, Kantorowicz, Hauptmeyer, gestaltet ist, verwendbar, wenn der O.-K. das erforderliche Gegenlager bietet.

Der einseitigen Adduktion steht natürlich die doppelseitige gegenüber. Die Adduktion beider Fragmente nach der Mitte tritt besonders bei Defektfrakturen des U.-K. auf. Sie kann zunächst fehlen und sich erst langsam, aber in immer steigendem Maße entwickeln. Die Fragmente sind dabei gleichzeitig mehr oder weniger nach innen gekippt. Ist die Adduktion nur schwach ausgeprägt, so können folgende Methoden erfolgreich angewandt werden:

1. der orthodontische Bogen von Angle,
2. ein stark federnder Draht.

Er wird in Röhrchen fixiert, nachdem er zuvor nach außen soviel aufgebogen ist, als der Molarenteil nach außen gebracht werden soll. Dadurch erhält der Bogen eine starke Federung, die die Molaren — und damit die Fragmente — nach außen zwingt. Die vor den Molaren liegende Zahnreihe wird an den freiliegenden Bogen herangeholt.

Auch der von 3) Ernst angegebene Verband reponiert durch den federnden Bogen. Sehr hohe Grade von Adduktion werden mit dem Bruhn'schen Scheren-Apparat behoben. Ähnlich wie dieser wirken die von Hauptmeyer, Steinkamm, Klughardt angegebenen Scherenapparate. Es sei Bruhn's Methode angeführt:

An jedem Fragment wird ein starker Bogen befestigt, der über die Unterlippe herüber den Mund verläßt und auf die andere Gefichtsseite hinübertritt. Die beiden Bogen überkreuzen sich also scherenförmig. Ihre Enden werden zu einem Haken umgebogen. Spannt man zwischen ihnen einen starken Gummizug, so nähert dieser die Enden der Schere und bringt so die Fragmente auseinander. Gleichzeitig soll er die Innenkipfung der Fragmente beheben; er soll diese aufrichten. Bruhn und Hauptmeyer benutzen gegossene oder gestanzte Kappenschienen, an die sie die Bügel anlöten.

Wassmund hat die Apparatur wie folgt vereinfacht: jedes Fragment wird zunächst durch einen auch lingual herumgreifenden Bogen gefaßt, der in Molarenbändern fixiert ist. An diesen Bogen wird der zweite aus dem Munde herausführende Scherenbogen mit Tinol festgelötet, das Ganze durch Drahtligaturen an den Zähnen befestigt. Liegt der Scherenbogen oben, so richtet er das gekippte Fragment gleichzeitig auf. Während Bruhn und Hauptmeyer die Scherenbogen außerhalb des Mundes gerade nach vorn gerichtet lassen, biegt Wassmund sie nach unten um, da sie in dieser Anordnung den Patienten weniger belästigen.

Ein anderer ebenfalls erfolgreicher Weg stellt die Benutzung beiderseitiger schiefer Ebenen dar.

Dislokation nach vorn:

Vereinzelte kommt es auch zur Verlagerung eines völlig isolierten Fragments nach vorn, besonders unter direkter Einwirkung einer Gewalt. Evtl. kann es bei schräg nach innen konvergierenden Bruchflächen noch nach außen gedrängt werden, indem die beiden anderen Fragmente nach medial adduziert werden. In diesem Falle besteht die Therapie darin, die Adduktion der seitlichen Fragmente aufzuheben, ohne die eine Reposition des mittleren nicht gelingt, dann wird das mittlere entweder von selbst nach hinten gleiten infolge des Zuges der Mundbodenmuskeln oder es wird von einem lingual verlaufenden Draht aus zurückgezogen.

Dislokation nach hinten:

Umgekehrt kann es natürlich auch zu einer Verlagerung eines Fragmentes nach der Mundhöhle kommen und zwar primär unter Einwirkung der Gewalt oder sekundär durch Muskelzug. Die Behandlung umfaßt hierbei zwei Phasen:

1. Aufhebung der Adduktion der seitlichen Fragmente,
2. Heranholen des mittleren an einen labial verlaufenden Draht.

Bei Frakturen des U.-K. im Bereich des Mittelstückes tritt als typische Dislokation der Fragmente die Drehung derselben um eine sagittale Achse gegen die Züge auf. Reicht der Bruch nicht über den Ansatz des musc. geniohyoideus hinaus, so ist die Form des Kieferbogens nicht stark verändert. Beim Mundöffnen neigen sich die Kieferhälften gegeneinander. Dieses als Atmen bezeichnetes Symptom wird auch dann beobachtet, wenn die Kallusbildung ziemlich weit fortgeschritten und röntgenologisch nachweisbar ist. Die Therapie besteht in der Spätbehandlung dieser Fälle in

der Anbringung von Drahtschienen im O.-K. und U.-K. und einer schiefen Ebene. Auch Gummizüge können hier in einigen Tagen die Dislokation aufheben. Sehr zweckmäßig läßt sich hier z. B. der von Hauptmeyer eingeführte Drahtösenverband benutzen.

Liegt die Fraktur des U.-K. im Bereich des seitlichen Teiles, so weicht das größere Fragment infolge des Muskelzuges nach der Gegend der Fraktur hin ab, sodaß die Mittellinie des U.-K. nach dieser Richtung hin verschoben ist. Das kleine Fragment ist nach vorne und oben sowie gegen die Mittellinie disloziert und um eine sagittale Achse zungenwärts gedreht.

Die Behandlung wird in einem Drahtverband nach Sauer, Schröder oder Hauptmeyer, schiefer Ebene sowie Gummizügen bestehen, die allmählich die ursprüngliche Lage der Fragmente bewirken.

Defektfrakturen:

Auch die Defektfrakturen innerhalb der Zahnreihen seien an dieser Stelle erwähnt. Hinsichtlich ihrer Ätiologie sei darauf verwiesen, daß sie häufig im Gefolge von Schußfrakturen, seltener bei Einwirkung von stumpfen Traumen auftreten. Secundär entstehen sie durch Ostitis eines Bruchspaltes. Eine bedeutende Rolle spielen sie als patholog. Frakturen durch Osteomyelitis, Tbc., Lues, malignen Tumoren.

Es ist leicht einzusehen, daß derartige Fälle namentlich in Kriegzeiten in das Gebiet der Spätbehandlung fallen werden. Es ist daher Aufgabe des Zahnarztes, die Fragmente zu reponieren und sie solange in einer richtigen Lage zu fixieren, bis Knochen- und Weichteilplastik durchgeführt und eingheilt ist.

Die auftretenden Dislokationen lassen sich mit Hilfe der schon angegebenen Methoden erreichen. Nur zur Retention sei noch einiges bemerkt. Sie ergibt nämlich die Notwendigkeit, die restierenden Fragmente möglichst solide zu fassen und zu verbinden. Ist der Defekt nicht sehr groß und haben beide Fragmente genügende Zahl von Zähnen, so genügt oft schon ein gewöhnlicher Drahtverband in je einem Röhrchen eines Molarenverbandes; an der Defektstelle und beiderseits darüber hinaus, wird der Bogen gekoppelt, evtl. wird ein durchlaufender gekoppelter Bogen verwandt. Ist der Defekt aber sehr groß und haben also die Zähne, an denen der Verband befestigt ist, viel zu leisten, so soll man möglichst alle noch vorhandenen Zähne zur Befestigung heranziehen. Für diesen Fall wird man gegossene oder gestanzte Kappenschienen oder verlötete Kronen sehr zweckmäßig finden. Bimstein nimmt einen Bogen, der am Ende viereckig gehalten ist und in viereckigen Kanülen verfenkt wird, die den Kronen buccal angelötet sind.

Das Wichtigste und Entscheidende jeder Kieferbruchbehandlung aber ist die starre Fixation der Bruchenden. Von ihr ist der Erfolg wesentlich abhängig. Gerade bei durch Ostitis entstandenen Defektfrakturen zeigt sich, daß feste Vereinigung der Fragmente sowie peinlichste Hygiene stets zum Ziele führen. Mögen auch Alveolarstücke sequestrieren, die Konsolidierung des Bruches beginnt dann von unten.

Spätbehandlung mehrfacher Brüche:

Gehen wir nun zur Spätbehandlung mehrfacher Brüche innerhalb der Zahnreihe über. Diese Art von Brüchen fallen besonders in Kriegszeiten der Spätbehandlung anheim und sind daher von besonderer Wichtigkeit. Die Fragmente sind für gewöhnlich „gegeneinander verschoben, ineinander verkeilt und untereinander verhakt“. Es sei einiges über die Möglichkeiten der Dislokation schlecht oder nicht behandelter Fälle gesagt. Bei den Brüchen mit zwei oder mehrfachen Bruchlinien können diese auf den ganzen horizontalen Ast verteilt sein oder sich auf die eine Kieferhälfte beschränken. In letzterem Falle würden mehr als drei Bruchlinien der Verletzung bereits den Charakter eines Splitterbruches verleihen. Nur bei den Brüchen mit zwei Bruchlinien, die annähernd symmetrisch zur Mittellinie liegen, können wir noch von typischen Verlagerungen sprechen, insofern, als das Mittelstück stets nach abwärts, die beiden Seitenfragmente immer nach außen aufwärts verlagert sein werden. Ist das Mittelstück hierbei überdies noch nach vorn verlagert, so sind beide Seitenfragmente im allgemeinen nach lingualwärts verschoben, ist dagegen das Mittelstück nach zungenwärts verlagert, so ist gewöhnlich ein Seitenfragment nach buccalwärts, das andere nach lingualwärts verdrängt. Das Mittelstück ist dabei außerdem mehr oder weniger um eine vertikale Achse gedreht. Liegen die beiden Bruchlinien in einer Kieferhöhle, so werden wir auch hier noch eine gewisse typische Verlagerung der Fragmente in vielen Fällen bemerken können. Die gesunde Seite wird stets nach der verletzten Seite abweichen. Das mittlere Fragment wird, wenn es sich auf den Bereich der Frontzähne beschränkt, mehr oder weniger um eine vertikale Achse gedreht und in toto entweder nach labial oder lingual aus der Zahnreihe herausgedrängt sein. Die Verlagerungen des hinteren und mittleren Fragments auf der verletzten Seite stehen in einer gewissen Abhängigkeit voneinander. Ist dieses nach vorn abgewichen, so wird jenes nach lingual verlagert sein und umgekehrt. Liegen beide Brüche einerseits in der Backzahngegend, so wird das zwischen ihnen liegende Fragment durch die Wirkung des musc. mylohyoideus nach zungenwärts verlagert und gekippt sein.

Je zahlreicher die Bruchlinien sind, desto typischer sind natürlich auch die Verlagerungen der Fragmente.

Therapie: Man muß zunächst durch einen stark nach außen federnden Bogen „für die einzelnen Bruchstücke Raum- und Bewegungsfreiheit schaffen“. Der Bogen muß also zunächst an den am weitesten nach hinten liegenden Fragmenten jeder Seite anfassen und sie auseinandertreiben. Dann werden die anderen Fragmente an den Bogen allmählich herangeholt. Wo die Zähne eines Fragmentes einem starken Zug evtl. nachgeben und luxiert würden, sind sie durch einen Entlastungsbogen unter sich zu verankern. Alsdann werden die Fragmente mit einem fortlaufenden Drahtverband gesichert, und in die richtige Okklusion eingestellt. Wenn die mittleren Fragmente evtl. so weit nach vorn getrieben sind, daß sie einem intraoralen Expansionsbogen den Weg verlegen, kann man mit

intra-extraoralen Verbänden, z.B. der Bruhn'schen Schere, die hinteren Fragmente erst soweit auseinanderbringen, daß die mittleren von selbst zurückweichen. Dann geht man wie oben angeführt vor.

Brüche hinter der Zahnreihe bis zum Kieferwinkel:

Es kommen nun die Brüche hinter der Zahnreihe bis zum Kieferwinkel zur Besprechung. Auch diese Brüche sind durch eine besondere Dislokation ausgezeichnet: das vordere bezahnte Fragment weicht nach unten und nach der kranken Seite ab. Evtl. tritt auch eine Kippung nach innen dazu auf. Die Elevation des hinteren, zahnlosen Fragments bewirkt außerdem, daß das vordere bezahnte Fragment nach vorn gedrängt wird. Das hintere, unbezahnte Fragment zeigt als typische und wichtigste Dislokation die nach vorn oben. Bei Substanzverlust ist die Elevation besonders groß.

Die Reposition der Fragmente ist nicht immer einfach. Wenn z. B. knöcherne Verwachsung eingetreten ist, so lehrt die Erfahrung, daß eine Durchtrennung unbedingt notwendig ist; erst dann sind orthopädische Maßnahmen angebracht. Auch durch fibröse Verwachsung (Pseudarthrose, Kallus) kann ein Vorgehen so erschwert und die Restitutio so verzögert werden, daß man chirurgische Durchtrennung zur Mobilisation der Fragmente vorzieht. In den zur Behandlung kommenden Fällen sind nun oft so große Kräfte zur Reposition notwendig, daß sie durch einen federnden Bogen mit angelöteter Pelotte vom zahntragenden Fragment oder vom O.-K. aus nicht immer zu erreichen sind. Man benutzt daher am besten den Gegenbiß des O.-K. zur Reposition. Zu diesem Zweck wird dem Alveolarfortsatz ein Korken, Gummikeil o. a. entsprechend seiner Form aufgelegt. Die obere Zahnreihe beißt dann gegen den Korken, der durch Fütterung mit Guttapercha oder Kautschuk sich der Form des unteren Alveolarfortsatzes anpaßt. Wichtig ist hierbei, den Biß so viel zu sperren, als das zahnlose Fragment eleviert ist. Ist dies geschehen, so wird das vordere, bezahnte Fragment durch Gummizüge in die Artikulation eingestellt. Schwierig sind natürlich die Verhältnisse bei schlecht bezahnten oder zahnlosen O.-K. Hier kann nämlich der Alveolarfortsatz so atrophisiert sein, daß er keinerlei Halt bietet. In diesen Fällen wird man auf völlige Reposition des zahnlosen Fragments verzichten und nur das vordere bezahnte Bruchstück reponieren, da auch durch eine Prothese ein Ausgleich in vielen Fällen geschaffen werden kann. Ist natürlich die Elevation von solch einem Grade, daß schwerwiegende kosmetische und funktionelle Störungen auftreten, so versucht man durch eine Kautschukplatte oder Schiene im O.-K. mit aufgebaute Wall ein Widerlager zu schaffen. Dieses Widerlager beißt nun in Form einer Pelotte gegen den U.K. Dadurch wird das zahnlose Fragment in normaler Stellung gehalten, während das bezahnte gehoben wird. Die Hebung des bezahnten Fragmentes, ebenso seine spätere Retention setzt feste Angriffspunkte voraus. Kommt man mit Drahtverbänden nicht aus, weil zu wenig Zähne vorhanden sind, muß eine Kautschukplatte mit extraoralen Bügeln und

Gummizügen nach dem Schädeldach fixiert werden. Zu diesem Zweck werden Haken einvulkanisiert, an denen Gummizüge befestigt werden. Ein ringsum laufender Kautschukwall kann dem U.-K. Gegenbiß schaffen.

Da die Retention ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, sei folgendes noch bemerkt: Der Weg, den Wassmund hier beschreitet, ist einfach und erfolgversprechend und soll daher erwähnt werden. Ein starker, halbrunder Drahtbogen wird der Zahnreihe entlang gebogen, den letzten Zahn noch vor dem Bruch umfassend. Er findet an der Naht eines oder zweier Vollbänder festen Halt. An ihn wird ein zweiter Draht angelötet, der am Ende eine aus Blech gebogene Pelotte trägt. Die Stärke des Drahtes beträgt je nach der zu überbrückenden Strecke 1,5—2,0 mm. Dabei braucht die Blechplatte nicht genau gebogen zu sein, da sie an der Unterfläche mit Guttapercha unterfüttert wird, somit sich der Form des Alveolarfortsatzes genau anpaßt. Um zu verhindern, daß das bezahnte Fragment nach der kranken Seite hin abweicht, wird eine schiefe Ebene auf der gefundenen Seite angebracht, oft genügt schon ein Gummizug. Auch der Gegenbiß läßt sich sehr erfolgreich zur Retention ausnutzen. Zu diesem Zweck wird auf der Pelotte mit zwei Drahtspitzen ein Korken oder ein Stück Gummi fest aufgespießt oder der Korken wird gleichzeitig als Pelotte benutzt, mit Guttapercha unterfüttert und auf einer Drahtgabel aufgespießt. Eine Drahtligatur verhindert das Abgleiten. Nach dem Vorbild von Schröder und Lubowski kann man auch das hintere Drahtende mit einem Stentskloß beschicken, zubeißen lassen und den so geformten Kloß aus Zinn an den Draht angießen oder aus Kautschuk anvulkanisieren. Braucht man schon zur Reposition eine Kautschukplatte mit Pelotte im O.-K., so kann man sich wenigstens einen Teil dieser oberen Pelotte noch einige Zeit erhalten, besonders dann, wenn mit Neigung zur erneuter Elevation zu rechnen ist. Die obere Platte sichert dann die Retention im Ruhebiß und die untere Pelotte hat nur die Retention in der Bewegung zu übernehmen. Diese Methode hat sich besonders bei veralteten Brüchen mit Pseudarthrosen bewährt.

Defektfrakturen:

Schwierig sind natürlich die Defektfrakturen zu behandeln. Bei einseitigem Defekt wendet man außer der Pelotte noch eine schiefe Ebene auf der gefundenen Seite an. Ist der Defekt sehr groß, so kann mit Erfolg die Nagelextension angewandt werden und zwar wird das zahnlose Fragment durch einen Extensionsnagel gefaßt und mit dem bezahnten durch einen extraoralen Drahtbogen verbunden. Bei doppelseitigen Defektfrakturen hat Schröder einen sehr praktischen und geistreichen Verband angegeben. Für gewöhnlich kommt man hier mit Pelotten und schiefen Ebenen aus.

Brüche des Kieferwinkels:

Wir kämen nun zur Besprechung der Brüche des Kieferwinkels. Machen wir zunächst uns klar, welche Richtung die dislozierten Fragmente

einnehmen können. Verläuft der Bruch gerade durch den Kieferwinkel, so besteht fast keine Dislokation, nur ist das vordere Fragment gewöhnlich etwas nach der kranken Seite abgewichen. Wenn er dagegen aber vor dem Kieferwinkel verläuft, dann weicht das vordere Fragment meist stark ab und weicht nach der kranken Seite aus. Die Elevation des hinteren Fragments drängt das vordere Fragment mehr oder weniger nach vorn. Besonders störend wirkt sie bei Defektfrakturen; der aufsteigende Ast wird nach vorn oben und außen und um seine Längsachse gedreht. Die vordere Kante des aufsteigenden Astes dreht sich dadurch nach außen. Der Kieferwinkel nach medial.

Allgemein ist zur Behandlung zu sagen, daß man versuchen muß, mit Hilfe von Pelotten, die an einer Kautschukfchiene oder Platte angebracht werden, sowie Gummizügen zum Ziele zu kommen. Eine Kopfkinnkappe kann helfen, den horizontalen Ast zu heben. Eine Kinnschleuder aus Gummi oder eine orthodontische Kinnkappe mit Zügen zum Kopfnetz können gute Dienste leisten. Diese Kinnkappe kann auch aus Kautschuk (Köppel) hergestellt werden. Für den einzelnen Fall ist nun zu sagen, daß bei lineärem Bruch durch den Kieferwinkel infolge der geringen Dislokation auch in älteren Fällen keine besondere Therapie eingeleitet zu werden braucht, da selbst bei nur fibröser Vereinigung eine Funktionsminderung nicht eintrat (Schröder, Wassmund). Liegt der Bruch vor dem Kieferwinkel, so sind schiefe Ebene sowie Gummizüge anzuwenden. Bei einseitigem Defektbruch führen Pelotten und schiefe Ebene zum Ziel; während bei doppelseitigen Defektfrakturen der Schröderverband sowie die Bruhn'sche Extensionszange sich gut bewährt haben.

Brüche des aufsteigenden Astes:

Brüche des aufsteigenden Astes sind selten. Eine Spätbehandlung wird daher nicht allzu häufig durchzuführen sein. Immerhin ist zu bemerken, daß diese Brüche manchmal mit schweren Verletzungen (commotio cerebri) Schädelbasisfraktur) verknüpft sind, sodaß es aus diesem Grunde zur Spätbehandlung kommt.

Vom Längsbruch des aufsteigenden Astes ist zu sagen, daß fast kaum eine Dislokation auftritt, daher eine besondere Therapie überflüssig ist. Selbst bei fibröser Vereinigung kann, wie Wassmund beobachtete, keine Funktionsstörung auftreten. Gegebenenfalls wird man diesen Bruch wie einen Collumbruch behandeln.

Beim Querbruch des aufsteigenden Astes ist ebenfalls die Dislokation gering. Wenn die Periostzerreißung größere Dislokation zuläßt, wird das obere Fragment nach oben eleviert, während das andere Bruchstück nach oben gehoben und sekundär nach hinten gleiten kann. Die Dislokation innerhalb der Zahnreihe ist also der eines einseitigen oder beiderseitigen Collumbruches ähnlich. Daher wird man auch mit den entsprechenden Mitteln, die bei dem Collumbruch therapeutisch verwandt werden, vorgehen.

Handelt es sich um Defektfrakturen, so wird man versuchen müssen, das obere Fragment durch eine Pelotte zu fassen. Im übrigen sind Gummizüge, Gleitschiene oder schiefe Ebene die gegebenen Mittel.

Bruch des proc. coronoideus:

Da bei Brüchen des proc. coronoideus eine Dislokation nicht eintritt, eine Funktionsminderung auch in veralteten Fällen (Wassmund, Schröder) nicht zu beobachten ist, braucht man nicht näher auf diese Fälle einzugehen. Es tritt nämlich meist eine fibröse funktionell völlig ausheilende Heilung ein. Wassmund erwähnt Fälle, in denen sogar eine knöcherne Heilung eintrat.

Bruch des proc. condyloideus:

Gehen wir nun zu den Brüchen des proc. condyloideus und des collum-mandibulae über. Bei einseitigem Bruch ist das große Fragment nach hinten oben und nach der kranken Seite verschoben, während das Gelenkköpfchen nach innen vorne sowie in die Horizontale gedreht wird. Bei beiderseitiger Fraktur wird das große Fragment nach hinten oben verlagert. Es entsteht eine offener Biß. Diese Brüche sind häufig mit anderen schweren Verletzungen verknüpft oder aber sie werden nicht erkannt, werden also häufig einer Spätbehandlung zugänglich gemacht werden. Bei einfachem Bruch besteht die Behandlung in Anbringung von Drahtschienen im O.-K. und U.-K. mit Häkchen für die Aufnahme von Gummizügen. Eine schiefe Ebene wird auf der gefunden Seite angebracht. Fehlen hier die Zähne, so kann die schiefe Ebene auch auf der kranken Seite angebracht werden, muß dann aber lingual an einem lingualen Bogen befestigt werden oder man benutzt die Gleitschiene nach Schröder; sie soll das Abweichen nach der kranken Seite verhindern — sie wird also auf der gefunden Seite angebracht.

Man wird namentlich dann zur Gleitschiene greifen, wenn es zwischen den Bruchstücken zu größeren Substanzverlusten gekommen ist oder in Fällen, bei denen die zur Unterstützung der schiefen Ebene dienenden Gummizüge nicht gelegt werden können. Sehr einfach und zweckmäßig läßt sich auch aus Hauptmeyer's fortlaufendem Drahtösenverband eine Gleitschiene herstellen durch Biegen einer Schlaufe im O.-K. und einer Schlinge im U.-K. und zwar im Bereich des ersten Molaren bzw. des zweiten Prämolaren.

Doppelseitige Brüche sind, vom frakturtechnischen Standpunkt gesehen, einfach zu behandeln. Gleitschiene oder schiefe Ebene braucht man für diese Brüche im allgemeinen nicht. Der Gummizug sichert die Gelenkführung. Es wird im O.-K. und U.-K. je eine Drahtschiene angebracht; ein jederseits angebrachter intramaxillärer Gummizug dient sowohl der Reposition als auch der Retention.

Auch der Defektfrakturen des aufsteigenden Astes sei gedacht, da in veralteten Fällen die Aufgabe des Zahnarztes darin besteht, die Fragmente soweit wie möglich zu reponieren und sie dann so zu fixieren, daß der Chirurg in Tätigkeit treten kann.

Liegt der Defekt im oberen oder mittleren Teil, so hat man zu versuchen, mit Hilfe von schiefer Ebene, Gleitschiene sowie Gummizügen zum Ziele zu kommen. Ist der Defekt auf den unteren Teil beschränkt, so stehen uns folgende Möglichkeiten zur Behandlung offen:

1. Reposition mit Hilfe einer federnden Pelotte am O.-K. oder U.-K. angebracht oder
2. durch eine starre Pelotte und Gummizüge. Es ist Prinzip dabei, das bezahnte Fragment zu korrigieren, nicht das unbezahnte.
3. Mit Hilfe der Nagelexension:
der im Knochen befestigte Nagel soll erlauben, erstens das Fragment zu reponieren, wenn es stark verlängert ist und zweitens, die Fragmente unter sich zu fixieren.

Bekannte Extensionsapparate, mit denen gute Erfolge erzielt wurden, sind die nach Schröder, Wasmund sowie Bruhn-Lindemann.

Brüche des unbezahnten Kiefers:

Bevor wir die Brüche des U.-K. verlassen, sei noch einiges über die Brüche des unbezahnten bzw. ungenügend bezahnten Kiefers gesagt. Sie stellen oft schwierige Aufgaben dar und werden natürlich überhaupt nur dann behandelt, wenn funktionelle oder kosmetische Störungen allzu groß sind. Interessant ist der Weg, den Port und Gunning in derartigen Fällen beschritten:

Sie nahmen eine Prothese, die eine Immobilisation hervorrief. Durch einen Ausschnitt in der Front wurden dem Patient die Speisen zugeführt. Auch nicht immer ist diese Methode anwendbar, namentlich nicht bei mehrfachen Brüchen, hier muß die Knochennaht als ultimo ratio dienen. Der Nachteil der Knochennaht liegt in der Tatsache, daß sie als Fremdkörper wirkt, oft die Konsolidation verzögert und nicht selten zur Nekrose und Abstoßung der Sequester führt. Es kommt zu einer leidlichen Konsolidation meist narbiger Natur und stellt somit eine Pseudarthrose dar.

Bei nicht zu großen Defektfrakturen wird man seine Zuflucht zur Prothese und Immobilisation der Kiefer nehmen. Bemerkenswert sind die Versuche, den U.-K. so schienen zu wollen, daß eine intraorale Schiene am Kiefferrand den U.-K. zwischen sich fassen und fixieren will. Solche Verbände sind von Ruthenik, Lohmann-Witzel, angegeben worden. Ein anderer brauchbarer Weg stellt die Nagelexension dar.

Oberkiefer-Brüche:

O.-K.-Brüche sind allgemein gesehen viel seltener infolge der geschützten Lage, so daß damit die Notwendigkeit einer Spätbehandlung nicht allzu häufig an den Zahnarzt bzw. Chirurgen herantreten wird. Zudem verlaufen die O.-K.-Brüche sehr viel häufiger ohne Dislokation als die U.-K.-Brüche, da die Weichteile die gebrochenen O.-K.-Knochen einigermaßen zusammenhalten. In dem Fehlen von Dislokation und von begleitenden Weichteilverletzungen liegt die Erklärung der Tatsache, daß die O.-K.-Brüche manchmal verkannt werden.

Auch bei den O.-K.-Brüchen gilt der schon aufgestellte Grundsatz, daß eine geringe Dislokation nicht zum therapeutischen Vorgehen herausfordert, sondern man hier bemüht sein wird, durch prothetische Ausnahmen einen Ausgleich zu schaffen; letzteres gilt besonders für den disloziert verwachsenen Bruch des zahnlosen O.-K. Die Folgen einer nicht- bzw. spezialistischen Behandlung können gegebenenfalls schwer sein, so verweist Duffik auf solche Fälle, in denen ausgedehnte Defekte des Gaumens und der Kieferwand entstanden, die nur mit Obturatoren zu decken waren.

Ist völlige knöcherne Verheilung in dislozierter Stellung eingetreten und besteht diese schon längere Zeit, so gestattet nur operative Mobilisation des dislozierten Fragments durch submucöse Osteotomie die nachträgliche Reposition.

Die Behandlung der Alveolarbrüche wurde schon bei denen des U.-K. erwähnt.

Bei Querbrüchen empfiehlt Schröder den Goffres-Verband, und zwar im Sinne und in der Art des Extensionsverbandes, indem man den Bügel nach vorn federn läßt, oder zwischen Bügel und Schiene einen Gummizug anbringt.

Ist der O.-K. in sagittaler Richtung nach hinten verlagert, so haben sich die Extensionsverbände zur Reposition in nicht zu alten Fällen bewährt. Sie sind im Prinzip so gebaut, daß von einem möglichst stabilen und fest sitzenden Kopfverband aus vor dem Gesicht des Patienten in einiger Entfernung von der Mundöffnung ein fixer Punkt geschaffen wird, von dem der nach hinten gesunkene O.-K. nach vorne zu ziehen ist, durch Gummizüge oder durch Schraubenwirkung. Es seien hier eine Reihe von bekannten Apparaten angeführt:

1. Bimstein-Apparatur — an der Kopffbandage tritt an der Stirngrenze ein kräftiger sagittal eingestellter Stahlbügel hervor, der vor dem Gesicht des Patienten in geringem Abstand vom Nasenrücken diesem entlang läuft, um vor der Mundöffnung einen fixen Punkt zu schaffen, von dem der dislozierte O.-K. in seine richtige Lage gezogen werden kann. Zu diesem Zweck trägt das freie Ende des Drahtschenkels einen mit einer Schraube zu befestigenden Querbalken, der seinerseits zwei Schlitze aufweist zur Aufnahme zweier, mit Schraubengewinde versehener kräftiger Drähte, die mit einer, die Zähne des O.-K. umfassenden, auf ihnen fest zementierten Metallkappen versehen sind. Nach richtiger Einstellung des Querbügels werden die freien, durch die Schlitze hindurchtretenden Schraubenenden mit Muttern versehen, die entsprechend angezogen werden. Diese Vorrichtung ermöglichte es, den O.-K. auf einer bestimmten Ebene nach vorn zu ziehen.

2. Grawinkel konstruierte ebenfalls eine gut wirkende Apparatur, aber sie hat den Nachteil, allzu kompliziert zu sein und wird daher wohl nicht angewandt.

3. Schlamp-Ringleitapparat.

An einer unteren Drahtschiene sind Drahtschenkel seitlich angelötet. Sie werden durch den Mundspalt nach außen geführt, sodaß sie im Mundwinkelabstand parallel zur Gesichtsmittle verlaufen und stirnwärts ziehen. Auf ihnen gleiten Hakenringe, durch Querriegel am Aufspringen verhindert. Gegebenenfalls sind Drähte zur Abstützung gezogen. Auch im O.-K. ist eine Drahtschiene angelegt, deren Drahthaken sich in der Mundwinkelgegend befinden. Zwischen beiden Drahthaken werden nun Gummizüge gespannt, die den Oberkiefer nach vorn holen.

Für intraorale Verbände kommt als Kraft der Gummiring und die schiefe Ebene in Betracht.

Gerade in veralteten Fällen verrichtet der Gummizug gute Dienste, bei denen das Fragment bindegewebig-callös konsolidiert ist.

Ist nun z. B. der O.-K. nach hinten rechts disloziert, so geht Wassmund so vor, daß die obere Zahnreihe mit einem palatinal liegenden Drahtverband gefaßt wird. Die untere Zahnreihe erhält gleichfalls einen Bogen, um den an einen Zahn fassenden Zug des Gummis auf alle Zähne zu übertragen. Die Gummizüge werden in der Richtung gespannt, in der der O.-K. bewegt werden soll. Damit sie am palatinalen Bogen nicht rutschen, werden einige kleinere Drahthaken angelötet. Die Reposition gelingt dann meist in drei bis acht Tagen. Mit Hilfe der Züge erreicht man auch eine genaue Einstellung in die Artikulation. Die Züge bleiben solange liegen, bis das Fragment keine Neigung mehr zeigt, in die dislozierte Stellung zurückzuweichen — dies ist nach zwei bis drei Wochen erreicht.

Diese Schienung scheitert natürlich, wenn zu wenig Zähne vorhanden sind oder wenn gleichzeitig ein Bruch im U.-K. vorliegt.

Meist reichen die extra-intraoralen Verbände bei den alten Brüchen nicht aus; in diesem Falle wird man mit Hilfe eines Gewichtes extendieren. Der O.-K. würde wie bisher beschrieben gefaßt werden. Was aber hat im Falle einer Transversalfraktur zu geschehen, bei dem das Fragment abwärts gesunken ist? Hier muß ein extra-intraoraler Verband mit Kopfkappe herangezogen werden. Folgende Methode hat sich hier gut bewährt: Nach einem O.-K.-Abdruck wird eine die Zahnreihe umgreifende Kappenschiene gestanzt oder gegossen. Die nach rückwärts aus dem Munde heraufführenden Bügel aus mindestens 3 mm starkem Draht werden angelötet und durch Gummizüge mit der Kopfkappe verbunden. Die Kopfkappe braucht nur aus wenigen aneinander genähten, nicht zu schmalen Gurten bestehen. Wassmund verwendet mit Erfolg eine Binde mit eingewebter Kante, an die mehrere Häkchen angenäht werden, als Kopfkappe.

Perthes verwendet in diesen Fällen folgende Apparatur: Die Zahnreihe wird mit einem runden Draht gefaßt, der ihr genau parallel verläuft und in Röhrchen fixiert ist. Im Frontzahngebiet wird ein zweiter 2—2,5 mm starker harter Draht angelötet (mit Tinol) und führt aus dem Munde heraus. Die Enden dieser Bügel erhalten Haken durch angelötete Drahtstücke. Als Kopfkappe dient lediglich eine Binde mit gewebter

Kante, die evtl. durch untergenährte Wattelage weicher gemacht werden kann. Zwischen Drahtbügel und Kopfkappe werden Gummizüge gespannt. Sie müssen so gerichtet sein, daß der Zug gerade nach oben wirkt und eine Kippung des Fragments vermieden wird. Das wird durch entsprechende Befestigung der Haken an den Drahtbügeln und an den Kopfkappen je nach Lage des Falles gleich erreicht. Gelegentlich ist auch nötig, weiter nach vorn einen Zug wirken zu lassen.

Ist das Schädeldach auch verletzt, so läßt sich auch der Wustrow'sche Scherenapparat in nicht zu alten Fällen anwenden. Der Unterkiefer wird mit einer Drahtschiene versehen. Zwei daran angelötete Drahtschenkel verlaufen extraoral um den Mundwinkel nach oben, etwa entlang dem Jochbogen. Ebenso wird die Oberkiefer-Zahnreihe geschiert. Die dazu gehörigen beiden extraoralen Drahtschenkel gehen nach unten, kreuzen also die Unterkieferschiene und laufen entlang dem Unterkieferrand zum Kieferwinkel. Die zwischen beiden Drahtschenkeln ausgespannten Gummizüge lassen nun die Kraft in dem Sinne wirken, daß der O.-K. nach oben, der U.-K. nach unten „gedrückt“ wird. — Wie aber soll ein zahnloser O.-K. reponiert werden?

Man geht hier so vor, daß extra-orale Bügel an die meist vorhandene Prothese angebracht werden. Durch Gummizüge nach dem Schädeldach wird die Prothese an den O.-K., dieser aber fest an die Schädelbasis angezogen. Meist ist es aber so, daß chirurgisch am O.-K. ein Angriffspunkt geschaffen werden muß, um dann mit Hilfe eines Kopfstreckverbandes oder durch Gewichtsexension zum Ziele zu gelangen. Gerade die Gewichtsexension, die von Hausmann eingeführt wurde, hat sich in veralteten Fällen, bei denen große Kräfte zur Behebung der Dislokation nötig sind, gut bewährt. Um den O.-K. fassen zu können, wurde von Wassmund eine Extensionsklammer eingeführt. Sie faßt den Alveolarfortsatz von palatinal und labial und beißt sich durch den Druck einer Feder und den Zug des Gewichts in den Knochen ein. Für palatinal sind zwei Haken gewählt worden, um das foramen incisivum zu umgehen und beiderseits von ihm anfassen zu können. Zur Anbringung wird nur Schleimhaut und Periost durch eine Stichinzision gespalten, die Klammer angelegt und festgedrückt.

Es sei nun ein von Wassmund beschriebener Fall, bei dem die Extensionsklammer sowie Gewichtsexension angewandt wurde, beschrieben, da hier die Wirkung und Erfolg mit den angegebenen Mitteln sehr deutlich ist.

Der O.-K. war zahnlos und in toto nach hinten um etwa 1 cm verlagert. Die Extensionsklammer wurde am O.-K.-Fortsatz befestigt. Von ihr führte eine Schnur über eine Rolle zu einem Gewicht von zwei Kilogramm. Damit der Kopf dem Zug nicht folgte, wurde er durch eine Gegenextension festgelegt. Zudem verläuft eine gut gepolsterte Binde über die Stirn, eine andere faßt um das Kinn. Beide sind am Ohr vernäht. Von hier geht eine Schnur durch die Kissen und die Matratze und trägt unter dem Bett ein Gewicht von je 1 kg. Nach 24 Stunden hatte

der gleichmäßige Zug des Gewichts die Dislokation schonend und völlig beseitigt. Danach wurde das Gewicht auf 1 kg verringert. In dieser Form blieb die Extension noch 5 Tage bestehen, wirkte so als Retention und wurde dann entfernt. Nunmehr wurde die vorliegende obere Prothese eingesetzt, die inzwischen zwei extra-orale Bügel erhalten hatte. Mit diesen Bügeln und Gummizügen wurde sie am Schädeldach befestigt und somit der O.-K. an die Schädelbasis angedrückt und bis zur Heilung retiniert. Nach weiteren 14 Tagen war er genügend konsolidiert, so daß der Zug nach dem Schädeldach wegbleiben konnte.

Immerhin zeigt doch dieser Fall, daß man ganz ohne Gewichtsextension nicht auskommen kann.

Frakturen des Kindergebisses:

Auch der Frakturen des Kindergebisses sei gedacht. Die schwerwiegenden Folgen einer Pseudarthrose hatten wir schon erwähnt. Nun kann die Behandlung der Frakturen im Milchgebiß sich hin und wieder durch die ungünstige anatomische Form der Zähne, die klein und konisch sind, sowie durch den Zahnwechsel nicht immer einfach gestalten. Für die Norm wird man aber auch in den veralteten Fällen mit den sonst üblichen Mitteln wie Drahtschiene, Gummizug, schiefe Ebene usw. zum Ziele gelangen.

Für vertikale Dislokationen hat sich nach Schröders Angaben der Hahl'sche geteilte Drahtverband mit Schraubenvorrichtung gut bewährt. Zur Befestigung der Teilstücke, die durch Schraubenwirkung bis zum Ausgleich der Dislokation zusammengezogen werden, reichen die um die ersten Molaren und Milchmolaren gelegten niedrigen Drahtklammern nicht aus, aber zusammen mit den buccalwärts angelegten, dem Alveolarfortsatz aufliegenden Stützwangen, deren Innenflächen mit schwarzer Guttapercha belegt sind, ergeben sie eine genügende Fixation.

Pseudarthrose:

Auch die Pseudarthrose spielt in unserem zu besprechendem Gebiet eine nicht unbedeutende Rolle, denn wir kennen eine Reihe von Gründen, die zu ihrer Entstehung führen. Wir wissen, daß

1. schlecht fixierte Fragmente,
2. nicht behandelte Frakturen,
3. eigenwillige Entfernung der Dentalschienen durch den Patienten

zur Pseudarthrosenbildung führen kann. Es gehören hierher die Fälle, bei denen erst spät eine Frakturenbehandlung einsetzte und sich schon eine Pseudarthrose inzwischen gebildet hat. Es sei ferner der Vollständigkeit halber erwähnt, daß durch Weichteilinterposition nach Eiterung und Ostitis eines lineären Bruches, dann bei Nichtbehandlung von Allgemeinerkrankungen (Lues, Tbc. . . .) eine knöcherne Konsolidierung von Fragmenten nicht eintritt. Es sind also genügend Gründe, auf die Pseudarthrose und ihrer Behandlung einzugehen. Sie spielt allerdings in Kriegszeiten infolge der größeren Defektfrakturen und der erst meist spät einsetzenden Kieferbruchbehandlung eine größere Rolle als in Friedenszeiten. So beob-

achtete Noris in zwei Fällen bei 150 Frakturen eine Pseudarthrofenbildung. Nach Béranger-Feraud machen sie etwa 2% aus.

Als Pseudarthrofen können nur solche Kontinuitätstrennungen bezeichnet werden, bei denen die Fragmente nicht knöchern, sondern nur durch B.G. vereinigt sind.

Über die schwerwiegenden Folgen der Pseudarthrose wurde schon eingangs berichtet.

Welche Wege stehen uns nun zur Behandlung der Pseudarthrofen offen?

Eingangs sei erwähnt, daß Pseudarthrofen des Kieferwinkels, des aufsteigenden Astes sowie des proc. coronoideus meist mit einer Funktionsbehinderung nicht einhergehen, sodaß sich eine Behandlung erübrigt. Falls kein Defekt in der Kontinuität des Kiefers vorliegt, wird man zunächst seine Zuflucht zu konservativen Mitteln nehmen. In Fällen, bei denen ein größerer Defekt besteht, ist nur bei chirurgischem Vorgehen ein Erfolg der Behandlung zu erwarten.

Wir müssen uns darüber klar sein, daß wir mit unseren konservativen Mitteln keinen Erfolg erzielen werden, wenn nicht vorher die örtlichen Störungen (schlechte Fixation) behoben oder die spezifische Behandlung allgemeiner Leiden (Tbc., Lues, Störung des Kalkstoffwechsels ...) einsetzt. Durch einfache orthodontische Apparate läßt sich dann in den meisten Fällen eine Heilung erzielen.

Das einfachste physikalische Mittel ist das Beklopfen der Bruchstelle mit dem Holzhammer nach Thones oder mit dem Perkussionshammer. Der hammerartig aufschlagende Finger oder die mechanische Kopfmassage können ebenfalls Erfolge hervorrufen. Zilz verweist auf derartige Fälle. Bleibt die Wirkung aus, so gilt auch als kallusanregendes Mittel örtliche Wärme (Sollux, Diathermie). Seifert erzielte bei richtiger Fixation gute Erfolge hiermit oder man bedient sich der Einspritzung leicht reizender chemischer Mittel wie etwa der Osmiumsäurelösung, verdünnter Jodtinktur, Alkohol, Terpentinöl, Chlorzink, Milchsäure in das Gewebe um die Frakturstelle. Hierhin ist auch die wohl sicher nicht als spezifisches Mittel anzusprechende Fibrininjektion nach Bergell zu rechnen. Eine besondere Stellung nehmen die Bluteinspritzungen nach Bier ein. Bier hat nämlich in Erkennung der Bedeutung des Hämatoms für die Kallusbildung geraten, dem Patienten Blut zu entnehmen und dieses an Ort der Pseudarthrose einzuspritzen. Die Erfahrungen, die man mit der Bier'schen Methode machte, sind in einigen Fällen günstig, in anderen weniger günstig gewesen. So berichtet Wassmund von einem Fall, bei dem nach mehrmaliger Injektion von Eigenblut Konfolidation im Laufe von 5 Monaten wirklich eintrat. Aber auch über Mißerfolge wird von ihm berichtet.

Es gibt nun Fälle von lange nicht behandelten Brüchen, bei denen eine Konfolidierung eintrat, sobald ein Verband die abnorme Beweglichkeit der Fragmente aufhob.

Also ohne physikalische Mittel lassen sich namentlich die jungen Pseudarthrosen noch mit Erfolg behandeln, denn in den ersten 10—15 Wochen ist die bindegewebige Vereinigung der Fragmente noch nicht durch eine faserreiche, zell- und gefäßarme Narbe hergestellt, wie bei der alten und fertigen Pseudarthrose. Die junge Pseudarthrose wird vielmehr noch zum größten Teil aus zell- und gefäßreichem Granulationsgewebe gebildet, mit Einlagerung einiger Narbenstränge. Daher kann es auch noch zu knöchernen Konsolidationen kommen, wenn die Beweglichkeit der Fragmente völlig verhindert wird.

Für Pseudarthrosen innerhalb der Zahnreihen hat sich nach Wassmund's Angaben besonders gut der schon an anderer Stelle erwähnte „Köppel'sche gedoppelte Bogen“ bewährt.

Wir folgern also: für jüngere, nicht mit Defekt verbundene Pseudarthrosen ist die starre Fixation der Fragmente die gegebene Therapie.

Bleibt die Konsolidation aus, so muß chirurgisch vorgegangen werden.

In Fällen, in denen chirurgisch vorgegangen werden muß, beschreibt Wassmund folgenden Weg:

Er legt den Bruch von außen frei und entfernt alles Bindegewebe unter gleichzeitiger Auffrischung des Knochens. Es folgte die Schienung der Fragmente. Knöcherne Heilung trat oft, jedoch nicht immer ein, sodaß Wassmund diese Methode als nicht zuverlässig bezeichnete, da nämlich der Knochen und die umgebenden Weichteile nicht immer die genügende Regenerationskraft aufbrachten. Sicherer ist daher die Osteoplastik, die mit größter Wahrscheinlichkeit ein gutes Resultat ergibt.

Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang die Ansicht Lindemanns, daß nur dann ein Erfolg zu verzeichnen sei, wenn dem Knochen ein kräftiger Reiz zugemutet und neuer Mutterboden zugeführt wird. Er ist daher ein eifriger Verfechter der Osteoplastik, die beide Forderungen bestens erfüllt. Er entfernt daher breit alles Narbengewebe, frischt den Knochen bis in's Gefunde an und pflanzt ein Stück Beckenkamm ein.

Interessant ist das Vorgehen von Klapp und Lexer:

Eigenartigerweise rühren sie die Pseudarthrosen nicht an, sondern überbrücken sie durch einen Knochen-Perioftspan aus der Tibia, den sie in der Periofttasche beiderseits der Pseudarthrose versenken. Mit dieser Methode haben beide Autoren gute Erfolge erzielt. Zu bedenken ist jedoch bei jeder Osteoplastik, daß Komplikationen eintreten können. Damit wäre der Erfolg illusorisch und der Defekt das Resultat. Einfacher wäre noch der Weg, daß man das im Bruchspalt befindliche Narbengewebe entfernt und man sorgte, daß das Perioft beider Fragmente sich berührt, da von ihm ja die Knochenbildung ausgeht. Eine gute starre Schienung der Bruchenden ist natürlich Voraussetzung für einen Erfolg. Träte wirklich eine Verkürzung des Kiefers ein, so ließe er sich ja nachträglich wieder dehnen.

Zu erwähnen ist noch, daß man sich auch nicht über die Art der Ruhigstellung einig ist.

So führen Lindemann-Bruhn absolute starre Immobilisation des ganzen U.-K. für die ersten 7—8 Wochen durch Drahtverföhnürung mit der oberen Zahnreihe durch. Ganzer-Klapp sind dagegen für den Reiz der Funktion. Sie fixieren die Fragmente unter sich.

Unser Vorgehen richtet sich ganz nach dem vorliegenden Fall und es muß daher eine rein individuelle Therapie getrieben werden.

Es gibt nun eine Reihe von Fällen, bei denen zunächst der Chirurg eingreifen muß, um eine erfolgreiche Spätbehandlung durchführen zu können.

Hierhin gehören zunächst die difform und knöchern verwachsenen Frakturen, sobald sie älter als $\frac{3}{4}$ Jahr sind. Es ist hier zwecklos, mit Kieverschienen Therapie zu treiben. Hier muß schon eine Durchtrennung des Knochens stattfinden, um eine Reposition und Retention zu ermöglichen. Es gehören hierhin ferner sämtliche ältere Pseudarthrosen, denn das derbe, zell- und gefäßarme Gewebe läßt sich weder durch physikalische Mittel, noch durch irgendeine Schiene beeinflussen. Auch bei Osteomyelitis des U.-K. muß zur Osteotomie geschritten werden, wenn in Dislokation verteilte Spontanfrakturen eine Entstellung oder eine Aufhebung der Artikulation verursachen.

Für die Stelle der Knochentrennung ist zu bemerken, daß sie nicht an die alten Bruchgrenzen gebunden ist, maßgebend ist vielmehr die Funktionsstörung und -entstehung. Nach den gemachten Erfahrungen (Wassmund, Perthes, Borchers, Mayerhofer) ist es nicht ratsam, die Osteotomie am Orte des alten Bruches vorzunehmen. Es befindet sich hier viel gefäß- und zellarmes Narbengewebe, das zur Kallusbildung wenig regenerationsfähige Kraft besitzt. Der Ort des Bruches ist nach Bier „ein keimarmer oder sogar steriler Mutterboden“. Für die Wahl des Ortes hat Wassmund drei wichtige Grundsätze aufgestellt. Sie sollen an dieser Stelle erwähnt werden.

1. die Mundhöhle darf nicht eröffnet, die Schleimhaut nicht verletzt werden;
2. Gefäße und Nerven des canalis-mandib. sollen möglichst geschont werden.
3. Es muß die Möglichkeit bestehen, die Fragmente frakturtechnisch zu fassen und zu bewegen. Die Bezaunung ist also wesentlich mitbestimmend für den Ort der Trennung.

Werden diese Grundsätze nicht befolgt, so besteht leicht die Gefahr der Infektion oder der Nekrose und ausbleibender Heilung.

Es sollen nun einige einfache Methoden der Osteotomie bekannter Autoren (Wassmund, Borchers, Perthes ...) angeführt werden.

Die Osteotomie im horizontalen Ast und am Kieferwinkel sind in der Technik der Ausführung gleich. Wassmund, der auf diesem Gebiete große Erfahrung besitzt, geht wie folgt vor:

Es wird ein Schnitt 1 cm unterhalb des U.-K.-Randes bis zum Periost angelegt. Dann folgt stumpfes Abtrennen der Weichteile. Es ist Prinzip dabei, das Periost so wenig wie möglich vom Knochens abzu-

heben, da es neben Knochenmark der Mutterboden der Regeneration ist. An der Vorderseite (Außenseite) beläßt man das Periost auf dem Knochen. Im Gebiet der Schleimhaut wird es abgehoben, da die Trennung der Schleimhaut vom Periost mit größter Wahrscheinlichkeit zum Einriß der Schleimhaut führt; daher geht Klöppel so vor, daß er das Periost nahe dem oberen und unteren Rand des U.-K. spaltet, um dann an der unteren und oberen Kante des Knochens Periost samt Schleimhaut abzulösen. Es folgt dann subperiostale Freilegung des Knochens an seiner ganzen Innenfläche. Mit einem Hohlmeißel wird nun der kanalis-mandib. vorsichtig aufgeschlagen und der Nerv. alv. inf. herausgezogen. Wassmund hat hier eine Verfeinerung der Methode getroffen. Mit Hilfe einer Gigilifäge, die um den Knochen geführt wird, durchfägt er den Knochen bis auf $\frac{3}{4}$ seiner Dicke. Ein leichter Meißelschlag mit dünnem, scharfem Meißel durchtrennt den Rest der corticalis. Es folgt Durchbrechung der spongiosa durch einen breiten flachen Meißel, der um seine Achse gedreht wird. Nun ist der Bruch vollständig. Hierdurch gelingt es meist sogar, die Gefäße unverletzt zu erhalten. Während der Durchtrennung werden die Weichteile durch stumpfe Instrumente abgedeckt und besonders die Schleimhaut vor Verletzung geschützt. Dichte Nähte beendigen die Operation. Die Wunde läßt man zunächst einige Tage verheilen. Erst dann läßt man die vor der Operation eingesetzte Apparatur, die nach den schon angegebenen Prinzipien gebaut ist, wirken.

Bei der Osteotomie am Kieferwinkel sei noch auf folgendes hingewiesen.

Hier ist es fast immer eine Verlagerung des horizontalen Astes nach der Seite und hinten, die die Osteotomie notwendig macht. Da nun die Durchtrennung die Rückverlagerung des vorderen Fragments nach vorn erlauben soll, der aufsteigende Ast aber nicht weiter nach vorn ausweichen darf, meist sogar noch weiter nach hinten gebracht werden muß, entsteht am Bruchort ein Defekt. Dies bedeutet aber eine erhebliche Schwierigkeit. Führt beispielsweise die Pelotte infolge Auftretens von decubitus nicht zum Ziel, so kann Nagelexension nötig werden.

Es sei nun noch auf die Osteotomie im aufsteigenden Ast eingegangen. Sie spielt bei veralteten Fällen von Frakturen des Kieferköpfchens eine wesentliche Rolle, namentlich dann, wenn die orthopädische Behandlung mit Hilfe von an Zähnen angreifenden Schienenverbänden (z. B. Schröder's Gleitschiene) nicht zum Ziele führt. Perthes stellt hier drei Wege zur Wahl:

1. die Osteotomie an der Frakturstelle,
2. die Resektion des Kieferköpfchens,
3. die Osteotomie oberhalb des Kieferwinkels nach einer von Perthes und Schloßmann ausgebildeten Methode.

Sowohl die Osteotomie an der Frakturstelle, als auch die Resektion des abgebrochenen und luxierten Kieferköpfchens — eine zuerst von Schlösser und Pamperl angewandte Methode — hat Perthes in je einem Fall ausgeführt, jedoch hat ihn der Erfolg nicht ganz befriedigt, indem die Kau-

funktion mehr oder weniger gestört blieb. Diese Erfahrungen gaben den Anstoß, überhaupt nicht die Stelle der Verletzung selbst in Angriff zu nehmen, sondern die Verkürzung des aufsteigenden Astes durch eine Osteotomie oberhalb des Kieferwinkels und entsprechende Verschiebung auszugleichen. Schlößmann hat 1917, Perthes 1923 mit der Methode absolut normale Funktionen und ideale Verhältnisse der Artikulation bei mit Dislokation verheilten von Kieferhalsfraktur erzielt. Es sei nun diese Operationsmethode angeführt:

Von einem etwa fingerbreit unter dem Kiefferrande geführten Schnitt, der hinten über den Kieferwinkel hinausgeht, dringt man auf den unteren Rand des Kieferkörpers vor und setzt nach Spaltung des Periost einen breiten Meißel flach auf den Kiefferrand auf, sodaß mit einigen leichten Schlägen die Insertion des Masseters in ihrem hinteren Abschnitt mit samt einer ganz dünnen Knochenlamelle von dem Kiefer abgeschält werden kann. Diese Desinsertion des Masseter wird soweit getrieben, daß eine der Breite des Kieferkörpers entsprechende, also etwa 3 cm einnehmende Fläche des Knochens entblößt wird. Am oberen Rand dieser freigelegten Fläche, der also etwa der Verlängerung einer durch die Kauflächen der unteren Zahnkronen gelegten Linie entspricht, wird mit dem Drillbohrer ein Bohrloch neben dem andern angelegt, sodaß die Bohrkanäle steil von unten außen nach oben innen gerichtet sind. Nach Anlegen von 4—5 Bohrlöchern wird ein scharfer Meißel mit messerförmiger Schneide in die Richtung der Bohrkanäle eingesetzt und durchtrennt den Kiefer in der durch Kanäle vorgeschriebenen Ebene. Der hochgehobene Masseter wird zurückgeschlagen und die Hautwunde genäht. Nunmehr können die vor der Operation angebrachten Schienen mit samt den intermaxillären Gummizügen in Tätigkeit treten. Wenn die beiden Kiefer sich gleich nach der Operation in ganz normale Beziehung bringen lassen, so stellt Perthes eine völlige Immobilisation der Kiefer her. Nach 6—8 Wochen kann dann meist der Unterkiefer freigegeben werden.

Nachdem wir nun die verschiedenen Methoden, deren wir uns zur Spätbehandlung bedienen können, seien sie nun frakturtechnischer oder chirurgischer Art, kennengelernt haben, ist die Frage nach dem Erfolge wohl berechtigt,

Es ist nun so, daß man in der Fachliteratur keine Fälle findet, bei denen ein Mißerfolg der Spätbehandlung zu verzeichnen war, vorausgesetzt natürlich, daß die vorher angeführten Methoden angewandt werden. Es ist so, daß jeder Autor mit seiner Methode seine Erfolge erzielte.

In der Natur der Sache liegt es, daß man Kieferbrüche nicht nach einem Schema behandeln kann. So schreibt Schröder: „Wenn irgendwo, so ist bei der Behandlung der Kieferfrakturen eine Schematisierung der therapeutischen Methoden unzulässig. Jeder Fall verlangt eine sorgfältig durchdachte, seiner Eigenart entsprechende Lösung. Die Behandlung erfordert daher eine eingehende Individualisierung, ein Modifizieren und Kombinieren der vorhandenen Methoden je nach dem einzelnen Fall.“

Das gleiche gilt auch für die Spätbehandlung von Kieferbrüchen. Wir folgern somit:

Alle Methoden können bei fachgemäßer Anwendung zum Erfolg führen.

Ein Schema für ihre Anwendung kann bei der Verschiedenartigkeit der einzelnen Fälle grundsätzlich nicht aufgestellt werden.

Jeder einzelne Fall erfordert eine seiner Eigenart entsprechende Behandlung.

Am Schlusse meiner Arbeit erfülle ich die angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Balters für die freundliche Überlassung des Themas sowie für die mir in gütigster Weise zur Verfügung gestellten Krankengeschichten meinen herzlichen Dank auszusprechen.

Schrifttum.

1. Port-Euler: Lehrbuch der Zahnheilkunde.
2. Perthes-Borchers: Verletzungen und Krankheiten der Kiefer.
3. B. Mayrhofer: Chirurgie der dentalen Mund- und Kieferkrankheiten.
4. J. Misch: Die Kriegsverletzungen der Kiefer und der angrenzenden Teile. 1916.
5. E. Seifert: Chirurgie des Kopfes und des Halses.
6. E. Sonntag und W. Rosenthal: Lehrbuch der Mund- und Kieferchirurgie.
7. M. Wassmund: Frakturen und Luxationen des Gesichtschädels.
8. Kantorowicz: Klinische Zahnheilkunde.
9. E. Reichenbach: Leitfaden der Kieferbruchbehandlung. 1935.
10. R. Klapp und H. Schröder: Die Unterkieferfußbrüche.
11. H. Schröder: Frakturen und Luxationen der Kiefer.
12. Hauptmeyer: Schienenverbände D.Z.W. 1935.
13. Schlamp: Beitrag zur funktionellen Kieferbruchbehandlung. D.Z.W. 1929.
14. Wustrow: Leitgesetze der Kieferbruchbehandlung. Z.R. 1920.
15. L. Landgraf: Erfahrung in der Behandlung der Kieferbrüche. D.Z.W. 1916.
16. Frank: Einiges über Kieferschienungen. D.Z.W. 1918.
17. Dussik: Die Anwendung von Kautschukschienen. V.f.Z. österr.-ung. 1919.
18. Kincaid: Kieferfrakturen. D.Z.W. 1930.
19. Bruhn: Über Kieferbrüche. M.M.W. 1929.
20. Klughardt: Beobachtungen und Erfahrungen bei der Kieferbruchbehandlung.

21. Bergmann, Bruhn und Mikulicz: Handbuch der prakt. Chirurgie. 1900.
22. Schlatter: Verletzungen und Erkrankungen der Kiefer. 1907.
23. Zilz: Beiträge zur Kiefertherapie. Z.R. 1917.
24. Matti: Knochenbrüche.
25. Steinberg: Prakt. Erfahrungen bei orthodontisch behandelten Kieferbrüchen. D.Z.W. 1916.
26. Bernh. Dirks: Beitrag zur zahnärztlichen funkt. Schienung. D.M. f. Z. 1921.
27. Bimstein: Die zahnärztl.-orthop. Behandlung der Kieferverletzten. D.Z. 1918.
28. Kuhl-Lindemann: Die Folgen einer spät einsetzenden Behandlung der Kieferbeschädigungen und ihre Beseitigung. 1917.
29. W. Balters: Leitfäden der zahnärztl. Röntgenologie. 1925.
30. Hauptmeyer: Handbuch der Zahnheilkunde. 1917.
31. Lubowski: Behandlung disloz. verheilte U.-K.-Frakturen D.M. f. Z. 1916.
32. Port: Veraltete Kieferfraktur. Mo. f. Z. 1901.
33. Bruhn: Handbuch der Zahnheilkunde.
34. Walkhoff: Beitrag zur Behandlung schlecht geheilter Kieferbrüche. M.M.W. 1916.
35. Haberer: Verletzungen und Erkrankungen des knöchernen Schädels. 1923.
36. Warnekos: Behandlung der Kieferfrakturen. B.Kl.W. 1900.
37. Thornung: Beitrag zur Behandlung von Kieferfrakturen. D.Z. W. 1929.
38. Kersting: Erfahrungen bei Behandlung von Kieferbrüchen.
39. Fuchs: Die zahnärztlichen Erstmaßnahmen bei frischen Kieferverletzungen. 1935.

Lebenslauf.

Ich, Hans Warczak, wurde am 3. Dezember 1911 in Duisburg als Sohn des städtischen Beamten Johann Warczak sowie seiner Ehefrau Gertrud geborene Gimborn geboren.

Nach bestandener Reifeprüfung am Steinhart-Realgymnasium in Duisburg wandte ich mich seit dem 1. Mai 1933 dem Studium der Zahnheilkunde zu und studierte sämtliche Semester und zwar seit SS. 1933 in Bonn, wo ich am 3. November 1936 mein zahnärztliches Staatsexamen bestand und die Approbation als Zahnarzt erhielt.
